





BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadio

XXV

Num.° d'ordine



B

Palchetto

160

26 16 77 34

NAZIONALE

B. Prov.

XXV

60

NAPOLI

BIBLIOTECA

VITT. EMANUELE III

~~I 2647-25~~

~~I 234 7/2~~

~~I 293 2/0~~

~~I 2025~~

~~I 635~~

~~B. P.~~

~~I~~


~~294~~

~~Jacouyl 315~~

BIB. PROV.

xxv

60



ELEMENTI
DI
MATEMATICA.



6066h7
SON

BIBLIOTECA PROV. N. 101
DI
NAPOLI

ELEMENTI
D I
MATEMATICA

Composti per uso della
REALE ACCADEMIA MILITARE

DAL PROFESSORE DI FISICA SPERIMENTALE,
E CHIMICA, E DIRETTORE DELLE
SCIENZE DELLA MEDESIMA

VITO CARAVELLI.

TOMO II.



R. A. M.

IN NAPOLI MDCCXCIII.

PRESSO GAETANO RAIMONDI
CON LICENZA DE' SUPERIORI.


Stampato in Napoli

500000



E L E M E N T I
D I
GEOMETRIA
P I A N A .

Edizione 6. fatta in Ottobre 1793.



I N D I C E

DE' CAPI CONTENUTI IN
QUESTO TOMO.

DEFINIZIONI, E NOZIONI PRELIMINARI..	pag. 1.
<u>POSTULATI.</u>	<u>15</u>
<u>ASSIOMI.</u>	<u>17</u>



L I B R O I.

Delle teoriche fondamentali della
Geometria Piana.



<u>CAP. I. Delle operazioni fondamentali della Geometria piana.</u>	<u>20</u>
<u>CAP. II. Della teorica delle linee rette perpendicolari, e oblique ad altre.</u>	<u>26</u>
<u>CAP. III. Della teorica delle linee rette parallele.</u>	<u>31.</u>
<u>CAP. IV. Delle proprietà de' triangoli e per rispetto degli angoli, e per ri- spetto de' lati.</u>	<u>37</u>
<u>CAP. V.</u>	

CAP. V. Della perfetta uguaglianza de' triangoli .	43
CAP. VI. Delle proprietà fondamentali de' parallelogrammi , e della semplice uguaglianza sì de' parallelogrammi, che de' triangoli .	47
CAP. VII. Della teorica de' rettangoli , e quadrati :	53
CAP. VIII. Della quantità de' quadrati formati su i lati de' triangoli .	64
CAP. IX. Si sciolgono alcuni problemi, che appartengono alla teorica de' quadrati , e de' rettangoli .	68



L I B R O II.

Della teorica del Cerchio .



CAP. I. Del sito che ha il centro nel cerchio , e del modo di trovarlo .	72
CAP. II. Dell' ordine , che serbano nella grandezza le rette tirate alla periferia di qualunque cerchio .	77
CAP. III. Delle tangenti de' cerchi , e del modo di tirarle .	83
CAP. IV.	

CAP. IV. Degli angoli formati e ai
centri, e alle periferie de' cerchi. 88

CAP. V. Dell' uguaglianza de' rettangoli
formati dalle rette, le quali, incon-
trandosi dentro, o fuori del cerchio,
tramezzano tra 'l punto dell' incontro,
e la periferia. 103

CAP. VI. Delle iscrizioni sì delle figure
regolari ne' cerchi, che de' cerchi nelle
figure regolari, e delle circoscrizioni
tanto delle figure regolari intorno
a' cerchi, quanto de' cerchi intorno alle
figure regolari. 109



L I B R O III.

Della dottrina della Ragione, e
Proporzione geometrica.



DEFINIZIONI, E NOZIONI
PRELIMINARI. 135

CAP. I. De' caratteri da conoscere l'ugua-
glianza, e la disuguaglianza delle ra-
gioni; e dell' uso di tali caratteri
in determinare di quali grandezze le
ragio-

*ragioni sono uguali , e di quali sono
disuguali.* 148

CAP. II. *Della dottrina della ragione
composta.* 156

CAP. III. *Delle principali trasforma-
zioni , che si possono fare nelle due
ragioni di qualsivoglia proporzione geome-
trica , senza togliere la propor-
zione .* 161

CAP. IV. *Delle proprietà della propor-
zione , che ha tutt' i termini omo-
genei.* 164

CAP. V. *Della teorica delle grandezze ,
che hanno tra esse ragioni ordinate , e
perturbate , e di ciò , che da tale
teorica deriva.* 168



L I B R O I V .

Delle tioriche più rilevanti della
Geom. Piana , che dalla dottrina
della ragione , e della
proporzione geometrica
derivano .



CAP. I. Delle ragioni uguali , che si
possono avere con dividere uno , o due
lati di qualunque triangolo . 174

CAP. II. De' caratteri da conoscere e la
simiglianza de' triangoli , e quella de'
parallelogrammi . 179

CAP. III. Del modo di dividere qualun-
que retta secondo qualsivoglia data
ragione ; e del modo di trovare una
retta , che sia in proporzione con altre
rette date . 188

CAP. IV. Delle ragioni de' triangoli , e
de' parallelogrammi . 195

CAP. V. Dell' uguaglianza de' triangoli ,
e de' parallelogrammi , che hanno le basi
in ragione reciproca delle altezze ; e
dell' uguaglianza de' rettangoli formati
da rette proporzionali . 199

CAP. VI.

CAP. VI. Della ragione , e proporzio-
nalità de' rettilinei simili , e de' princi-
pali probl. appartenenti alla teorica
de' medesimi rettilinei simili . 203

CAP. VII. Delle ragioni degli angoli
fatti e ai centri , e alle circonferenze
de' cerchi , e di quelle de' settori
circolari . 210

CAP. VIII. Delle ragioni , che hanno
le periferie circolari , i cerchi , i
settori , e le porzioni di essi , e della
quadratura di tali spazj . 215

CAP. IX. Della ragione , che senza sen-
sibile errore si può prendere per quella
del diametro di qualunque cerchio alla
sua periferia . 222



ELEMENTI
D. I.
GEOMETRIA
P I A N A.

[illegible]

DEFINIZIONI, E NOZIONI PRELIMINARI.

DEFINIZIONE I.

- x. **L**A *Geometria* è una scienza, che tratta della quantità continua, dimostrandone le proprietà di essa.

A V V E R T I M E N T O.

2. Le specie della quantità continua sono
Tom. II. A i so-

E L E M E N T I

2
i solidi , le superficie , e le linee .

D E F I N I Z I O N E II.

3. Si dice *solida* , o *corpo* ogni estensione , o ogni spazio , che ha lunghezza , larghezza , e profondità .

D E F I N I Z I O N E III.

4. Ciò , che termina , o racchiude il solido , si dice *superficie* ,

C O R O L L A R I O ,

5. Dunque la superficie non ha profondità ; e perciò è essa una estensione , che ha solamente lunghezza , e larghezza .

D E F I N I Z I O N E IV.

6. Ciò che termina , o racchiude la superficie , si dice *linea* ,

C O R O L L A R I O .

7. Sicchè la linea è senza profondità , e senza larghezza ; e perciò è essa una estensione , che ha solamente lunghezza .

DE.

DEFINIZIONE V.

8. Ciò, che termina, o racchiude la linea ne' suoi estremi, si chiama *punto*.

COROLLARIO I.

9. Il punto adunque è privo di profondità, di larghezza, e di lunghezza; onde non ha esso grandezza alcuna.

COROLLARIO II.

10. Non essendo ciò, che termina una grandezza parte componente di essa, ma estremo degli ultimi suoi componenti; ne segue non essere i punti parti delle linee, le linee parti delle superficie, e le superficie parti de' solidi. E' errore dunque il credere le linee composte da punti, le superficie composte da linee, ed i solidi composti da superficie.

COROLLARIO III.

11. Finalmente essendo i punti estremi delle linee, e le linee estremi delle superficie: se due linee, o due superficie s'intersecano; perchè quello, in cui s'intersecano, è estremo delle parti intersecate; farà esso un punto, se s'intersecheranno due li-

nee ; ed una linea , se s'intersecheranno due superficie . Onde nè le linee , nè le superficie , che s'intersecano , hanno comune alcuna porzione di esse .

AVVERTIMENTO.

12. Si noti che , per un mero concetto matematico , si considera generata la linea dallo scorrere d'un punto , la superficie dallo scorrere lateralmente d'una linea , e 'l solido generato dal muoversi su , o giù d'una superficie .

DEFINIZIONE VI.

13. Una linea si dice *retta* , se niuna delle sue parti è fuori della direzione delle altre ; si dice poi *curva* , se ognuna delle sue parti è fuori della direzione della sua vicina .

DEFINIZIONE VII.

14. Una superficie si dice *piana* , se niuna delle sue parti è fuori della direzione delle altre ; si dice poi *curva* , se ognuna delle sue parti è fuori della direzione della sua vicina .

DEFINIZIONE VIII.

15. Si chiama *angolo piano* la scambievole inclinazione di due linee, che, giacenti in un' istesso piano, s' incontrano senza formare una linea continuata. Il punto dell' incontro si dice *vertice*, e le due linee si dicono *lati* dell' angolo:

DEFINIZIONE IX.

16. L'angolo piano si dice *rettilineo*, s'è formato da due linee rette; *curvilineo*, s'è formato da due linee curve; e *mistilineo*, s'è fatto da una linea retta, ed una linea curva.

AVVERTIMENTO.

17. I Geometri contraffegnano sulle superficie i punti, con farvi su di esse piccioli segni coll' estremità della penna da scrivere, o di altro corpo aguzzo; e le linee con tratti di penna, o d' altro corpo aguzzo. Per esprimere poi un punto, una linea, ed un' angolo, mettono una lettera a lato del punto, due agli estremi della linea, e tre agli estremi di quelle, che formano l'angolo, e dicono: il punto A: la linea retta BC: la linea curva DE: l'angolo rettilineo FGH, o HGF: l'angolo curvilineo IKL: e

l'angolo mistilineo MNO , nominando sempre in mezzo la lettera , che sta al vertice; ovvero dicono l'angolo in G , in K , in N , nominando la sola lettera , ch' è al vertice , purchè non ne possa nascere equivoco .

DEFINIZIONE X.

18. Si dirà *base* d' un' angolo rettilineo la linea retta , che congiungerà gli estremi de' suoi lati .

COROLLARIO.

19. Consistendo l'angolo piano nell' inclinazione delle due linee , dalle quali viene formato : secondochè si farà esso maggiore , o minore ; così gli estremi de' suoi lati si renderanno più , o meno distanti tra di essi , e conseguentemente la base si farà maggiore , o minore : e secondocchè gli estremi de' lati si faranno più , o meno distanti tra di essi , e conseguentemente la base si farà maggiore , o minore ; così l'angolo si farà anche maggiore , o minore . Quindi se due angoli rettilinei ABC , DEF hanno i lati rispettivamente uguali , cioè il lato $AB = DE$, e $BC = EF$: secondochè sarà l'angolo ABC maggiore , uguale , o minore dell'angolo DEF ; così la base AC sarà maggiore , uguale , o minore della base DF : e secondochè la base AC sarà maggiore , uguale , o mi-

Fig.2.

DI GEOMETRIA PIANA. 7

minore della base DF ; così anche l'angolo ABC sarà maggiore, uguale, o minore dell'angolo DEF .

DEFINIZIONE XI.

20. Una linea retta si dice *perpendicolare* ad un'altra, se l'una cade sull'altra, senza inclinarsi più dall'una, che dall'altra banda ; si dice poi *obliqua*, se dall'una più, che dall'altra banda s' inclina . Finalmente gli angoli, che da ambedue le parti si formano in tutti e due i casi, si chiamano *angoli consecuenti* ; ed uno si dice pure *consequente* dell' altro .

DEFINIZIONE XII.

21. Si dice *angolo retto* quello, ch' è formato da due linee rette, quando l' una è perpendicolare all' altra . Si dicono poi *angolo ottuso* quello, ch' è maggiore del retto, ed *angolo acuto* quello, ch' è minore del retto .

Così se a CD sarà perpendicolare la retta AB , e obliqua la retta EB ; sarà retto sì Fig. 3. l'angolo ABC , che 'l suo conseguente uguale ABD ; e saranno l'angolo EBC ottuso, e l'angolo EBD acuto .

DEFINIZIONE XIII.

22. Due angoli si dicono *verticali* tra essi, se i lati di uno formano co' lati dell' altro linee continuate.

Fig. 4. Così l' angolo AOC si dice *verticale* coll' angolo BOD , e COB *verticale* con AOD .

DEFINIZIONE XIV.

23. Due linee rette, esistenti sull' istesso piano, si dicono *parallele*, se, prolungandole all' infinito da ambedue le parti, non s' uniscono giammai.

Fig. 5. Di tal sorta sono le rette AB , CD .

DEFINIZIONE XV.

24. *Termine* di checchessia si dice ciò, ch' è suo estremo.

AVVERTIMENTO.

25. I termini, che si considerano in Geometria, si riducono a punti, a linee, ed a superficie. I punti sono termini delle linee, le linee termini delle superficie, e le superficie termini de' solidi; perchè i punti sono estremi delle linee, le linee estremi delle superficie, e le superficie estremi de' solidi.

DE.

DEFINIZIONE XVI.

26. Si dice in generale *figura* ogni spazio racchiuso da tutte le parti da uno , o da più termini ; cioè da una , o più linee , da una , o più superficie . In ispezie poi si dicono *figura piana* ogni superficie piana terminata da una , o più linee , e *figura solida* ogni solido terminato da una , o più superficie .

DEFINIZIONE XVII.

27. Per *perimetro* d' una figura piana s' intende il suo termine intero .

AVVERTIMENTO.

28. I Geometri per esprimere una figura piana nominano le lettere , che stanno nel suo perimetro .

DEFINIZIONE XVIII.

29. Una figura piana si dice *rettilinea* ; se il perimetro è composto da linee rette ; si dice *curvilinea* , se il perimetro è una linea curva , o composto da linee curve ; si dice finalmente *mistilinea* , se il suo perimetro è composto da linee rette , e curve insieme ,

Fig. 6. Così $ABCDE$ è figura rettilinea ; EFG , ed $HIKL$ sono figure curvilinee ; ed $MNOPQ$ è figura mistilinea .

DEFINIZIONE XIX.

30. D' una figura rettilinea si dice *lato* qualunque linea componente il suo perimetro ; e si dice *base* qualunque lato , considerato come parte inferiore del perimetro .

DEFINIZIONE XX.

31. Una figura rettilinea si dice *trilatera* , se il suo perimetro costa di tre lati ; si dice *quadrilatera* , se costa di quattro ; e finalmente si dice *moltiplatera* , o *poligona* , se costa di più di quattro lati .

COROLLARIO.

32. Perchè nelle figure rettilinee tanti sono gli angoli , quanti sono i lati ; perciò si dicono ancora *triangolo* la figura trilatera , *quadrangolo* la quadrilatera , e *moltipangolo* la moltiplatera .

DEFINIZIONE XXI.

33. Il triangolo per rispetto de' lati si dice *equilatero* , se tutti e tre i lati sono uguali ; si dice *isoscele* , se sono uguali due
so-

DI GEOMETRIA PIANA. 11

folamente ; e finalmente si dice *scaleno* , se tutt' i lati sono disuguali . Per rispetto poi degli angoli si dice *rettangolo* , se uno degli angoli è retto ; si dice *ottusangolo* , se uno degli angoli è ottuso , e finalmente si dice *acutangolo* , se tutti e tre gli angoli sono acuti .

Così il triangolo ABC è equilatero ; avendo Fig. 7.
tutti e tre i lati AB , BC , CA uguali ; il triangolo DEF è isocelo , avendo uguali i due lati DE , EF ; il triangolo GHI è scaleno , avendo disuguali tutt' i lati ; il triangolo KLM è rettangolo ; avendo l' angolo in L retto ; il triangolo NOP è ottusangolo , avendo l' angolo ottuso in O ; e finalmente il triangolo QRS è acutangolo ; avendo tutt' i tre angoli acuti .

DEFINIZIONE XXII.

34. Nel triangolo rettangolo il lato opposto all' angolo retto si dice *ipotenusa* , e gli altri due lati si chiamano *cateti* .

Così nel triangolo KLM l' *ipotenusa* è KM , ed i *cateti* sono KL , LM .

DEFINIZIONE XXIII.

35. Una figura quadrilatera si dice *parallelogrammo* , se i lati opposti sono rette parallele ; si dice poi *trapezio* , se i lati opposti non sono rette parallele , o due di esse almeno non solo tali .

Co.

Fig. 8. Così $ABCD$ è parallelogrammo, ed $EFGH$ è trapezio.

DEFINIZIONE XXIV.

36. Un parallelogrammo si dice *quadrato*; se ha tutt' i lati uguali, e tutti gli angoli retti; si dice *rettangolo*, o *quadrilungo*, se ha tutti gli angoli retti, ma non tutt' i lati uguali; si dice *rombo*, se ha tutt' i lati uguali, ma non già gli angoli retti; e finalmente si dice *romboide*, se non ha nè gli angoli retti, nè tutt' i lati uguali.

Fig. 9. Così $ABCD$ è un quadrato; $EFGH$ è un rettangolo; $IKLM$ è un rombo; ed $NOPQ$ è un romboide.

DEFINIZIONE XXV.

37. Una figura moltangola si dice *pentagono*, *esagono*, *ettagono*, *ottagono*, ec., secondoche i suoi lati sono cinque, sei, sette, otto, ec., ed ha conseguentemente cinque, sei, sette, otto, ec. angoli.

DEFINIZIONE XXVI.

38. Una figura rettilinea si dice *equilatera*, o *equiangola*, secondoche ha uguali o tutt' i lati, o tutti gli angoli. Si dicono poi due figure rettilinee tra di esse *equilatera*, o *equiangole*, secondoche sono o i lati, o gli

gli angoli d' una rispettivamente uguali ai lati , o agli angoli dell' altra.

DEFINIZIONE XXVII.

39. Per *cerchio* , o *circolo* s' intende una figura piana , ch' è terminata da una linea curva , la quale ritorna in se stessa , e che ha un punto entro di essa tale , che tutte le linee rette , che da sì fatto punto si possono tirare alla detta curva , sono uguali.

DEFINIZIONE XXVIII.

40. La linea curva , che termina il cerchio , si dice *periferia* , o *circonferenza* del cerchio . Il punto , da cui procedono rette uguali alla periferia , si dice *centro* del cerchio . Finalmente le rette uguali procedenti dal centro alla periferia , si dicono *raggi* del cerchio .

Così lo spazio FEG è il cerchio ; la linea curva FEG è la periferia ; il punto O è il centro ; le rette OE , OF , OG , ec. sono i raggi . Fig. 6.

AVVERTIMENTO.

41. Concepiscono i Geometri , per un mezzo concetto matematico , generarsi il cerchio col muoversi una retta in una superficie piana intorno a un suo estremo fisso , ed immobile , e raggirarsi fino a che ritorni al primiero suo sito . DE.

DEFINIZIONE XXIX.

42. Si dice *arca* del cerchio qualunque porzione della sua periferia . La retta , che taglia l' arco , si dice *corda* dell' arco . Ogni corda , cha passa pel centro , si chiama *diametro* del cerchio .

Fig. 10. Così nel cerchio ABD la porzione AB , o $AEDB$ della periferia si dice arco ; la retta AB si dice corda sì dell' arco AB , che dell' arco $AEDB$; la corda FC si dice diametro .

COROLLARIO.

43. Essendo i raggi metà de' diametri ; perciò si dicono i raggi anche *mezzi diametri* .

DEFINIZIONE XXX.


44. Si dice *porzione* del cerchio lo spazio compreso tra un' arco , e la sua corda . La porzione tagliata da un diametro si dice *mezzo cerchio* . Lo spazio finalmente compreso da due raggi , e dall' arco , che gli stessi raggi racchiudono , si dice *settore* del cerchio .

Così lo spazio compreso tra l' arco AB , o $AEDB$, e la corda AB è porzione del cerchio . Gli spazj $FABC$, $FEDC$ sono mezzi cerchi . Finalmente lo spazio EOD è settore del cerchio , come settore è altresì lo spazio $EABDO$.

DE.

DEFINIZIONE XXXI.

45. Se la periferia di qualunque cerchio si divide in 360 parti uguali, ognuna di esse si chiama *grado*. Se un grado si divide in 60 altre parti uguali, ognuna di esse si chiama *minuta primo*, o *scrupolo primo*. Se un minuto primo si divide pure in 60 parti uguali, ognuna di esse si chiama *minuto secondo*, o *scrupolo secondo*; e così procedendo all' infinito.



POSTULATI.



POSTULATO I.

46. Tirare da un punto ad un' altro su d' un piano una linea retta.

POSTULATO II.

47. Data una linea retta terminata, prolungarla quanto si vuole.

POSTULATO III.

48. Dato qualunque punto per centro, e data qualunque linea retta per intervallo, descrivere un cerchio.


AV:

AVVERTIMENTO I.

49. Si noti che le operazioni , che disegnano di fare i due primi postulati , esigono la riga ; l' operazioni poi , che disegna di fare il terzo postulato , esige il compasso . E si noti altresì che tutte le operazioni , che si fanno nella Geometria elementare per isciorre i probl. s' eseguisciono colla riga , e col compasso ; perchè tutte si riducono a tirare , o prolungare linee rette , e a descrivere cerchi . Onde que' probl. geometrici , che , per isciorli , v' è bisogno dell' uso de' due detti strumenti , appartengono alla Geometria elementare ; tutti gli altri poi , che , per isciorli , v' è bisogno dell' uso d' altri strumenti , appartengono alla Geometria sublime .

AVVERTIMENTO II.

50. Si noti pure che se AB , e CD sono due linee rette disuguali ; descrivendo col centro A , estremo della retta maggiore AB , e coll' intervallo della retta minore CD l' arco circolare EFG , che intersechi la AB nel punto F ; s' avrà della retta maggiore AB la porzione AF uguale alla retta minore CD .



A S S I O M I.



A S S I O M A I.

51. Le grandezze, che sono uguali a una terza, sono uguali tra di esse; e di quelle, che sono uguali tra esse, se una è maggiore, o minore d' una terza, le altre sono anche maggiori, o minori dell' istessa terza.

A S S I O M A II.

52. Se a grandezze uguali s'aggiungono, porzioni uguali, le somme, che si hanno sono anche uguali.

A S S I O M A III.

53. Se da grandezze uguali si tolgono porzioni uguali, le restanti porzioni sono pure uguali.

A S S I O M A IV.

54. Se a grandezze disuguali s'aggiungono porzioni uguali, le somme, che si hanno, sono anche disuguali.

A S S I O M A V.

55. Se da grandezze disuguali si tolgono porzioni uguali, le restanti porzioni sono pure disuguali.

A S S I O M A VI.

56. Le grandezze, che sono doppie, triple, quadruple, ec., o metà, terze, quarte parti ec. d' una terza, sono anche tra esse uguali,

A S S I O M A VII.

57. Le grandezze, che combaciano insieme, sono tra esse uguali,

AVVERTIMENTO.

58. Combaciano insieme due grandezze, se, unita l' una coll' altra, l' una non esce fuori dell' altra in lunghezza, se sono linee, in lunghezza, e larghezza, se sono superficie, e in lunghezza, larghezza, e profondità, se sono solidi.

A S S I O M A VIII.

59. Tutt' una grandezza è sempre maggiore di qualunque sua parte; ed è tutt' una gran-

DI GEOMETRIA PIANA.

19

grandezza uguale a tutte le sue parti insieme prese,

A S S I O M A IX.

60. Due linee rette, comunque poste, non possono racchiudere spazio alcuno, cioè non possono formare alcuna figura geometrica.

A S S I O M A X.

61. Tutti gli angoli retti sono uguali.

A S S I O M A XI.

62. Di tutte le linee terminate ne' medesimi punti la linea retta è la più breve, e addita ella il cammino più breve, che far si possa da un punto a un' altro.

C O R O L L A R I O.

63. Essendo in ogni triangolo uno de' lati sempre la linea retta, che tramezza tra due punti, e gli altri due no. Dunque in ogni triangolo ogni lato è sempre minore della somma degli altri due.

A S S I O M A XII.

64. Se una grandezza è il doppio d' un' altra, e una parte di quella è il doppio d'

B 2

una

una parte di questa ; farà la restante porzione della prima anche il doppio della restante porzione della seconda.



LIBRO I.

Delle teoriche fondamentali della Geometria Piana.



C A P. I.

Delle operazioni fondamentali della Geometria Piana.



PROP. I. PROBL. I.

65. *Date tre rette tali , che qualunque di esse sia minore della somma delle altre due , costruire un triangolo , che abbia i lati rispettivamente uguali alle tre rette date.*

S O L U Z I O N E .

Sieno le rette date A, B, C .

Fig. 12

1. Si tiri la retta indefinita LN ; e da essa si taglino $LP = A, PQ = B, QM = C$ (§ 50).

2. Co' centri P , e Q , e cogli intervalli PL, QM si descrivano i cerchi LRT, MRV (§ 48), li quali s'intersecano colle periferie nel punto R .

3. Dal punto R agli punti P , e Q si tirino le rette RP, RQ (§ 46).

Dico essere PQR il triangolo cercato.

D I M O S T R A Z I O N E .

Essendo i punti P , e Q centri de' cerchi LRT, MRV ; faranno $PR = PL$, e $QR = QM$ (§ 39). Ma sono per la costruzione $PL = A, PQ = B, QM = C$. Dunque $RP = A, PQ = B, QR = C$. Sicchè s'è descritto il triangolo PQR cercato. Ch'è ciò, che bisognava fare, e dimostrare.

C O R O L L A R I O .

66. Se le tre rette LP, PQ, QM faranno uguali, il triangolo PQR farà equilatero. Se poi faranno uguali solamente PL, QM , l'istesso triangolo PQR farà isoscele

(§ 33). Sicchè si costruisce su d'una retta data PQ un triangolo equilatero, se prima si descrivano due cerchi LRT , MRV co' centri P , e Q , e coll'istesso intervallo PQ (§ 48); e poscia dal punto R , in cui s'intersecano le periferie de' cerchi descritti, agli punti P , e Q si tirano le rette RP , RQ (§ 46).

PROP. II. PROBL. II.

67. *Dato un punto in una retta, e dato un'angolo rettilineo, formare nel dato punto un'alt'angolo uguale all'angolo dato.*

SOLUZIONE.

Fig. 13. Sia dato il punto A nella retta AB , e sia dato l'angolo OMP .

1. Presi ne' lati MO , MP due punti ad arbitrio L , e N , s'uniscano colla retta LN .

2. Si prolunghi AB per quanto bisogna verso D , e F (§ 47); e si taglino $AD = MN$, $AB = LM$, e $BE = LN$ (§ 50).

3. Presi i punti A , e B per centri, e cogli intervalli AD , BE si descrivano i cerchi DCG , ECH (§ 48), li quali colle periferie s'intersecano nel punto C .

4. Finalmente dal punto A al punto C si tiri la retta AC (§ 46).

Dico essere BAC l'angolo cercato.

DI-

DIMOSTRAZIONE.

Essendo, congiunta la retta BC , il lato $AB = LM$, il lato $AC = AD$ (§ 39), e perciò uguale a MN , e la base $BC = BE$, e conseguentemente uguale alla base LN ; farà l'angolo BAC uguale all'angolo LMN (§ 19). Per la qual cosa nel dato punto A s'è fatto l'angolo BAC uguale al dato OMP . Ch'è ciò, che bisognava fare, e dimostrare.

PROP. III. PROBL. III.

68. *Dato qualunque angolo rettilineo, dividerlo in due parti uguali.*

SOLUZIONE.

Sia ABC l'angolo dato,

Fig. 14

1. Si prenda nel lato AB ad arbitrio il punto D ; e dal lato BC si tagli $BE = BD$ (§ 50); e si congiunga DE .

2. Su DE si faccia il triangolo equilatero DFE (§ 66).

3. Finalmente dal punto B al punto F si tiri la retta BF (§ 46).

Dico che BF divide l'angolo ABC in due parti uguali ABF , FBC .

DIMOSTRAZIONE.

Essendo il lato $BD = BE$ per la costruzione, il lato BF comune, e la base $DF = FE$, come lati del triangolo equilatero DFE ; farà l'angolo DBF uguale all'angolo EFF (§ 19) . . Per la qual cosa s'è diviso l'angolo AEC in due parti uguali. Ch'è ciò, che bisognava fare, e dimostrare.

COROLLARIO.

69. Se dell'istesso modo si divideranno successivamente in due parti uguali prima le metà dell'angolo ABC , poscia le quarte parti, indi le parti ottave, ec.; s'avrà l'angolo ABC diviso in 4, 8, 16, ec. parti uguali. Sicchè ogni angolo rettilineo colla riga, e col compasso si può dividere in 2, 4, 8, 16, 32, 64, ec. parti uguali.

AVVERTIMENTO.

70. Si noti che i problemi delle divisioni degli angoli rettilinei in tante parti uguali, quante ne disegnano i numeri, che tramezzano tra 2, 4, 8, 16, 32, 64, ec., appartengono alla Geom. sublime, e nella elementare sono impossibili; perchè esigono operazioni, che non si possono eseguire colla riga, e col compasso. L'angolo retto però

rò è divisibile nella Geo. elementare e in 3, e in 5 parti uguali, come si vedrà a suo luogo; e que' altri angoli, che si diranno pure a suo luogo, sono divisibili nella Geo. elementare, uno in tre parti uguali, e l'altro in cinque.

PROP. IV. PROBL. IV.

71. *Data qualunque linea retta terminata, dividerla in due parti uguali.*

SOLUZIONE.

Sia AB la retta data.

Fig. 15

1. Si faccia su AB il triangolo equilatero ABC (§ 66).


2. Si divida l'angolo ACB in due parti uguali colla retta CD (§ 68).

Dico essere AB divisa nel punto D in due parti uguali.

DIMOSTRAZIONE.

Imperciocchè gli angoli ACD, BCD sono uguali per la costruzione, e hanno il lato $AC = BC$, e'l lato CD comune. Dunque uguali sono anche le basi AD, DB (§ 19). E perciò s'è divisa la retta AB in due parti uguali in D. Ch'è ciò, che bisognava fare, e dimostrare.

CAP.



C A P. II.

Della teorica delle linee rette perpendicolari, e oblique ad altre.

PROP. V. PROBL. V.

72. *Dato un punto in una linea retta; innalzare dal punto dato un'altra retta perpendicolare alla data.*

S O L U Z I O N E.

Fig. 16. Sia dato il punto C nella retta AB .

1. Si prenda in CA il punto D ad arbitrio, e da CB si tagli $CE = CD$ (§ 50).

2. Si faccia su DE il triangolo equilatero DOE (§ 66); e dal punto O al punto C si tiri la retta OC (§ 46).

Dico essere OC la perpendicolare cercata.

D I M O S T R A Z I O N E.

Essendo il lato $CD = EC$, il lato OC comune, e la base $OD = OE$, faranno gli angoli OCD , OCE uguali (§ 19); e perciò OC è perpendicolare ad AB (§ 20).
Per la qual cosa dal dato punto C s'è innal-

DI GEOMETRIA PIANA. 27
nalzata la CO perpendicolare ad AB. Ch'è
ciò, che bisognava fare; e dimostrare.

PROP. VI. PROBL. VI.

73. *Data una retta; e dato un punto fuori della sua direzione; calare dal punto dato una perpendicolare alla retta data.*

S O L U Z I O N E.

Sieno AB la retta data, e O il punto dato.

1. Si prenda ad arbitrio il punto F, che stia per rispetto del punto O dall'altra banda della retta AB; e si congiunga OF (§ 46).

2. Si descriva col centro O, e coll'intervallo OF l'arco circolare DFE (§ 48); che interseca AB ne' punti D, e E.

3. Si divida DE in due parti uguali in C (§ 71); e si congiunga OC.

Dico essere OC la perpendicolare cercata.

D I M O S T R A Z I O N E.

Essendo, congiunte le rette OD, OE, il lato CD = CE per la costruzione; il lato OC comune; e la base OD = OE (§ 39); faranno gli angoli OCD, OCE uguali (§ 19). E perciò OC è perpendicolare ad AB (§ 20). Per la qual cosa dal dato punto
O s'è

O s'è calata OC perpendicolare ad AB. Ch' è ciò, che bisognava fare, e dimostrare.

PROP. VII. TEOR. I.

74. *Se una retta cade su d'un'altra, forma ella gli angoli conseguenti o retti, o insieme presi uguali a due retti.*

DIMOSTRAZIONE.

Fig. 3. In due modi sulla retta CD può caderne un'altra, o perpendicolarmente, come AB, o obbliquamente, come EB. Nel primo caso è chiaro essere gli angoli ABC, ABD uguali. (§ 20), e per conseguenza retti (§ 21). Nell'altro caso perchè l'angolo EBC è maggiore del retto ABC di quant'è l'angolo ABE, e l'angolo EBD è minore del retto ABD di quant'è pure ABE. Dunque, coll'ecceffo di uno sul retto compensando la mancanza dell'altro anche dal retto, farà la somma degli angoli conseguenti EBC, EBD uguale a due retti. Ch' è ciò, che bisognava dimostrare.

COROLLARIO.

Fig. 17 75. Quindi se in un punto, come O, s'uniscano quante rette si sieno OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG; perchè, prolungata AO in H, è uguale a due retti sì la somma

ma degli angoli AOB , BOC , COD , DOH , che la somma degli angoli HOE , EOF , FOG , GOA ; farà la somma di tutti gli angoli AOB , BOC , COD , DOE , EOF , FOG , GOA , dalle sudette rette nel punto O formati, uguale a quattro retti.

PROP. VIII. TEOR. II.

76. *Se due rette s'intersecano, gli angoli verticali, che fanno, sono tra essi uguali.*

DIMOSTRAZIONE.

S'intersechino AB , e CD in O . Essendo Fig. 4.
a due retti uguale sì la somma degli angoli AOC , AOD , che la somma degli angoli AOC , COB (§ 74); farà la somma di AOC , AOD uguale alla somma di AOC , COB (§ 51). Onde, toltone il comune AOC , farà l'angolo AOD uguale al suo verticale COB (§ 53). Similmente si dimostra essere uguali i verticali AOC , DOB . Sicchè se due rette, ec., Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. IX. TEOR. III.

77. *Se dall'estremo B della retta BE sic. Fig. 3.
no tirate per direzioni opposte due altre rette BC , BD in modo, che la somma degli angoli EBC , EBD sia uguale a due retti; forme-*

meranno CB , BD una retta continuata;

DIMOSTRAZIONE.


S' intenda CB prolungata a destra; farà l'angolo EBC , una col suo conseguente, uguale a due retti (§ 74); e perciò uguale alla somma di EBC , EBD . Onde, tolto il comune EBC , farà il conseguente di EBC uguale a EBD (§ 53). Sicchè BD combacia con CB prolungata; e conseguentemente CB , BD formano una retta continuata. Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. X. TEOR. IV.

Fig. 4. 78. *Se da qualunque punto O della retta AB sieno tirate per direzioni opposte due altre rette OC , OD in modo, che gli angoli COB , AOD sieno uguali; formeranno CO , OD pure una retta continuata.*

DIMOSTRAZIONE.

Imperciocchè, aggiugnendo agli angoli uguali AOD , COB il comune AOC , la somma di AOD , AOC uguaglierà la somma di AOC , COB (§ 52). Ma la somma di AOC , COB uguaglia due retti (§ 74). Dunque la somma di AOD , AOC anche uguaglia due retti (§ 51). E perciò CO , OD formano una retta continuata (§ 77).
Ch'



C A P. III.

*Della teorica delle linee rette
parallele.*

DEFINIZIONE.

79. Sieno le rette AB , CD esistenti nel Fig. 18
medesimo piano, e tagliate comunque da un'
altra retta EH . Si diranno *angoli alterni*
sì i due AFG , FGD , che i due BFG ,
 FGC . Si dirà *angolo esterno* ciascuno degli
quattro EFB , EFA , HGC , HGD . Si di-
ranno rispettivamente FGD , FGC , GFA ,
 GFB *angoli interni opposti* per riguardo de-
gli esterni EFB , EFA , HGC , HGD . Fi-
nalmente si diranno *angoli interni posti dall'*
istessa parte sì i due BFG , FGD , che i
due AFG , FGC .

PROP. IX. TEOR. V.

80. Se due rette AB , CD , esistenti nel
medesimo piano, vengono tagliate da un'al-
tra EH , e formano gli angoli interni posti
dall'istessa parte BFG , FGD uguali a due
retti, sono tali rette AB , CD parallele.

DI-

DIMOSTRAZIONE.

Se si nega essere AB , CD parallele, prolungate s'uniranno. S'uniscano, s'è possibile, nel punto O . Si prolunghi GC in I , finché sia $GI = FO$, e s'unisca IF . Essendo uguale a due retti si la somma degli angoli BFG , FGD , che la somma di FGD , FGC (§ 74); farà la somma di BFG , FGD uguale alla somma di FGD , FGC (§ 51). Onde, toltone il comune FGD , farà OFG uguale a FGI (§ 53). Essendo dunque gli angoli OFG , IGF uguali tra essi, e avendo il lato $OF = IG$, e 'l lato FG comune, farà la base $GO = FI$ (§ 19). Perciò nel triangolo IFO la somma de' lati OF , FI è uguale alla somma delle rette IG , GO , o sia al terzo lato IO . Ma ciò è impossibile (§ 63). Dunque è impossibile che AB , CD non sieno parallele. Per la qual cosa se due rette, ec.. Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

COROLLARIO.

81. Sebbene AB girando intorno al punto F possa ricevere infinite diverse posizioni; pure non ha AB se non se una sola posizione, nella quale è ella parallela a CD , come chiaramente si comprende per la nozione delle parallele. Ma AB è parallela a CD ,

CD, quando ha tale posizione, che la somma degli angoli BFG, FGD sia uguale a due retti. Dunque AB non è parallela a CD, se la posizione di AB è tale, che la somma degli angoli BFG, FGD sia maggiore, o minore di due retti.

PROP. XII. TEOR. VI.

82. Se due rette AB, CD, esistenti nel medesimo piano, vengono tagliate da un'altra retta EH, e formano gli angoli alterni uguali tra essi, o l'angolo esterno uguale al suo interno opposto; sono tali rette AB, CD tra esse parallele.

DIMOSTRAZIONE.

I. Sieno uguali gli alterni AFG, FGD. Sarà la somma de' due angoli BFG, FGD uguale alla somma di AFG, BFG (§ 52), cioè uguale a due retti (§ 74). Sicchè AB, CD sono parallele (§ 80).

II. Sia l'angolo esterno EFB uguale al suo interno opposto FGD. Sarà la somma di BFG, FGD uguale alla somma di EFB, BFG (§ 52), cioè uguale a due retti (§ 74). Onde AB, CD sono parallele (§ 80). Sicchè se due rette, ec. Ch'è quanto bisognava dimostrare.

PROP. XIII. TEOR. VII.

83. Se due rette parallele vengono tagliate comunque da un'altra retta; 1. la
Tom.III. C som-

somma degli angoli interni posti dall' istessa parte è uguale a due retti ; 2. gli angoli alterni sono tra essi uguali ; e 3. l' angolo esterno è uguale al suo interno opposto.

DIMOSTRAZIONE.

Sieno AB, CD parallele, e sieno comunque tagliate da EH.

I. Se la somma degli angoli BFG, FGD non è uguale a due retti, farà essa maggiore, o minore di due retti. Onde AB, CD non sono parallele (§ 81). Ma ciò ripugna all' ipotesi. Dunque la somma degli angoli BFG, FGD è uguale a due retti.

II. La somma degli angoli AFG, BFG è uguale a due retti (§ 74); e perciò uguale alla somma di BFG, FGD. Onde, toltone il comune BFG, l' angolo AFG è uguale al suo alterno FGD (§ 53).

III. L' angolo esterno EFB è uguale ad AFG (§ 76); e perciò uguale al suo interno opposto FGD. Sicchè se due rette parallele, ec., Ch' è quanto bisognava dimostrare.

PROP. XIV. TEOR. VIII.

84. Se due rette sono parallele ad una terza, sono anche tra esse parallele.

DIMOSTRAZIONE.

Fig. 19. Sieno AB, CD ambedue perallete ad EF. Si tiri GI con qualunque inclinazione. Sarranno

ranno l'angolo AGH uguale al suo alterno HIF, e l'angolo esterno GHD uguale al suo interno opposto HIF (§ prec.). Dunque gli angoli alterni AGH, GHD sono tra essi uguali (§ 51). E perciò AB, CD sono parallele (§ 82). Ch'è ciò, che bisognava dimostrare,

PROP. XV. TEOR. IX.

85. *Se due rette AD, BC sono uguali, Fig. 8. e parallele, e vengono congiunte dall' istessa parte dalle rette AB, DC; tali rette AB, DC sono pure uguali, e parallele.*

DIMOSTRAZIONE.

Imperciocchè, congiunta BD, gli angoli ADB, CBD, per le parallele AD, BC sono uguali (§ 83), e hanno il lato AD = BC per l'ipotesi, e'l lato BD comune. Dunque uguali sono pure le basi AB, CD (§ 19). In oltre sono il lato AB = DC, il lato AD = CB, e la base BD è comune. Sicchè uguali sono gli angoli BAD, BCD (§ 19); e perciò la somma degli angoli BAD, ADC è uguale alla somma degli angoli BCD, CDA (§ 52), e conseguentemente uguale a due retti (§ 83). Onde AB, DC sono anche parallele (§ 80). Ch'è quanto bisognava dimostrare.

PROP. XVI. PROBL. VII.

86. *Data una linea retta, e dato un*
C 2 *pun-*

punto fuori della sua direzione , tirare pel punto dato un'altra retta parallela alla retta data.

S O L U Z I O N E .

Fig. 20 Sia AB la retta data , e sia O il punto dato .


1. Si prenda in AB ad arbitrio il punto P , e si congiunga la retta OP (§ 46).

2. Si faccia nel punto O l'angolo POC uguale all'angolo OPB (§ 67); e si prolunghi CO verso D (§ 47).

Dico essere CD la parallela cercata.

D I M O S T R A Z I O N E .

Imperciochè per la costruzione gli angoli alterni COP , OPB sono uguali . Dunque CD è parallela ad AB (§ 82). Onde pel dato punto O s'è tirata la CD parallela ad AB . Ch'è ciò , che bisognava fare , e dimostrare .



C A P. IV.

Delle proprietà de' triangoli e per rispetto degli angoli , e per rispetto de' lati.

D E F I N I Z I O N E .

Fig. 21 87. Rappresenti ABC qualunque triangolo , e 'l lato AC si prolunghi verso D . Si dirà

dirà BCD *angolo esterno*, CBA, CAB li diranno i suoi *angoli interni opposti*.

PROP. XVII. TEOR. X.

88. *In ogni triangolo, se si prolunga un lato, l'angolo esterno è uguale alla somma delli due interni opposti, e tutti e tre gli angoli insieme presi sono uguali a due retti.*

DIMOSTRAZIONE.

Rappresenti ABC qualunque triangolo. Si prolunghi AC verso D; e pel punto C si tiri CE parallela ad AB (§ 86).

I. Essendo l'angolo in A uguale a DCE, e l'angolo in B uguale a BCE (§ 83). Sarà la somma degli angoli in A, e B uguale alla somma di DCE, ECB, o sia all'angolo esterno BCD.

II. Essendo la somma degli angoli in A, e B uguale all'angolo BCD; aggiuntovi di comune l'angolo BCA, farà la somma di CAB, ABC, BCA uguale alla somma di BCD, BCA (§ 52), o sia a due retti (§ 74). Sicche in ogni triangolo, ec. Ch'è quanto bisognava dimostrare.

COROLLARIO.

89. Quindi si ricavano I. che ogni angolo esterno di qualunque triangolo è maggio-

rè sempre di ciascuno de' suoi interni opposti: II. che due angoli qualunque d'un triangolo, insieme presi, sono sempre minori di due angoli retti; e perciò un triangolo non può avere nè più d'un'angolo retto, nè più d'un'angolo ottuso: e conseguentemente da un punto non si può innalzare, o calare su d'una retta, se non se una sola perpendicolare: III. che se la somma di due angoli d'un triangolo uguaglia la somma di due angoli d'un altro triangolo, gli angoli rimanenti saranno tra essi uguali.

AVVERTIMENTO.

Fig. 6. 90. Rappresenti ABCDE qualunque figura rettilinea; e, preso entro di essa ad arbitrio il punto O, si congingano le rette OA, OB, OC, OD, OE. Saranno tutti gli angoli de' triangoli AOB, BOC, COD, DOE, EOA, cioè tutti gli angoli della figura, una cogli angoli formati nel punto O, o una con quattro retti (§ 75) uguali a tanti retti, quanti ne disegna il doppio del numero de' lati dell'istessa figura ABCDE. Dunque se dalla somma di tanti retti, quanti ne disegna il doppio del numero de' lati d'una figura rettilinea, se ne tolgono quattro angoli retti, la somma de' retti restanti dà la somma di tutti gli angoli della figura.

PROP.

PROP. XVIII. TEOR. XI.

91. *Se in un triangolo due lati sono uguali, gli angoli opposti a tali lati sono anche uguali.*

DIMOSTRAZIONE.

Abbia il triangolo ABC il lato $AB = BC$. Fig. 22
Avendo i due angoli BAC , BCA il lato $AB = BC$, il lato AC comune, e le base $BC = BA$; faranno tali angoli BAC , BCA tra essi uguali [§ 19). Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

COROLLARIO.

92. Quindi; se un triangolo è equilatero, è anche equiangolo. E quindi ancora in ogni triangolo isoscele ABC la retta BD, se divide in due parti uguali ABD, DBC l'angolo ABC, divide in due parti uguali AD, DC anche la base AC; ed all'opposto; se divide in due parti uguali la base AC, divide pure in due parti uguali l'angolo ABC. Perchè avendo gli angoli ABD, DBC il lato $AB = BC$, e 'l lato BD comune; qualora l'angolo ABD è uguale a DBC, farà $AD = DC$, e qualora è $AD = DC$, farà l'angolo ABD uguale all'angolo DBC. Le medesime conseguenze hanno luo-

go per rispetto d' ogni angolo ne' triangoli equilateri .

PROP. XIX. TEOR. XII.

93. *Se in un triangolo due angoli sono uguali , i lati opposti a tali angoli sono anche tra essi uguali .*

DI MOSTRAZIONE.

Abbia il triangolo ABC gli angoli BAC BCA uguali . Se si nega essere $AB = BC$, farà AB maggiore , o minore di BC . Sia , s'è possibile , AB maggiore di BC . S'intenda tagliata $BE = EC$, e si congiunga CE . Essendo del triangolo CAE il lato AE prolungato in B , farà l'angolo BEC maggiore di CAE (§ 89) ; e perciò maggiore di ACB , e molto più maggiore di BCE . Sicchè nel triangolo EBC a' lati uguali BE , BC non sono opposti angoli uguali . Ma ciò ripugna (§ 91) . Dunque ripugna che sia AB maggiore di BC . Similmente si dimostra che AB non è minore di BC . Dunque è $AB = BC$. Ch'è ciò , che bisognava dimostrare .

COROLLARIO.

94. Quindi , se un triangolo è equiangolo , è anche equilatero .

PROP. XX. TEOR. XIII.

95. *Se in un triangolo un lato è maggiore d' un' altro , l' angolo opposto al lato maggiore è anche maggiore dell' angolo opposto al lato minore .*

DIMOSTRAZIONE.

Abbia il triangolo ABC il lato AC mag- Fig. 23
giore di AB . Si tagli $AD = AB$, e si congiunga BD . Essendo $AB = AD$, sarà l' angolo $ADB = ABD$ (§ 91). Ma l' angolo ABC è maggiore di ABD (§ 59). Dunque ABC è maggiore ancora di ADB (§ 51). E' in oltre ADB maggiore dell' angolo in C (§ 89) . Sicchè l' angolo ABC è molto più maggiore di ACB . Ch' è ciò , che bisognava dimostrare .

PROP.

PROP. XXI. TEOR. XIV.


96. *Se in un triangolo un'angolo è maggiore d'un'altro, il lato opposto all'angolo maggiore è anche maggiore del lato opposto all'angolo minore.*

DIMOSTRAZIONE.

Abbia. il triangolo ABC l'angolo ABC maggiore dell'angolo ACB . Se AC non è maggiore di AB , farà AC o uguale, o minore di AB . Dunque l'angolo ABC farà o uguale ad ACB (§ 91), o minore di ACB (§ prec.). Ma ambedue tali cose ripugnano all'ipotesi. Sicchè ripugna che AC non sia maggiore di AB . Per la qual cosa se in un triangolo, ec.. Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

COROLLARIO.

97. Quindi di tutte le rette, che da un punto su d'un'altra retta tirar si possono, la perpendicolare è la minima.



C A P. V.

*Della perfetta uguaglianza de'
triangoli.*

PROP. XXII. TEOR. XV.

98. *Se due triangoli ABC , DEF hanno Fig. 2.
il lato $AB = DE$ il lato $BC = EF$, e l'an-
golo ABC uguale a DEF ; avranno la base
 $AC = DF$, l'angolo in A uguale all'an-
golo in D , e l'angolo in C uguale all'an-
golo in F , e sarà il triangolo ABC uguale
al triangolo DEF .*

D I M O S T R A Z I O N E.

S' intenda il triangolo ABC posto sul
triangolo DEF in modo, che caschino il
punto B sul punto E , e 'l lato BA sul la-
to ED . Essendo l'angolo ABC uguale all'
angolo DEF per l'ipotesi, cascherà anche
il lato BC su EF . Ed essendo $AB = DE$,
e $BC = EF$, cascheranno pure il punto
 A sul punto D , e 'l punto C sul punto F .
Dunque combaciano la base AC con DF ,
l'angolo in A coll'angolo in D , l'angolo
in C coll'angolo in F , e 'l triangolo ABC
col

col triangolo DEF . Ma le grandezze , che combaciano , sono uguali (§ 57) : Sicchè sono la base $AC = DF$, l'angolo in A uguale all'angolo in D , l'angolo in C uguale all'angolo in E , e 'l triangolo ABC uguale al triangolo DEF . Ch' è ciò , che bisognava dimostrare .

PROP. XXIII. TEOR. XVI.

99. *Se due triangoli ABC , DEF , hanno il lato $AB = DE$, $BC = EF$, e la base $AC = DF$; faranno tali triangoli equiangoli , ed uguali .*

DIMOSTRAZIONE.

Essendo il lato $AB = DE$, il lato $BC = EF$, e la base $AC = DF$; farà l'angolo ABC uguale all'angolo DEF (§ 19) ; e conseguentemente per la precedente faranno l'angolo in A uguale all'angolo in D , l'angolo in C uguale all'angolo in F , e 'l triangolo ABC uguale al triangolo DEF . Ch' è ciò , che bisognava dimostrare .

PROP. XXIV. TEOR. XVII.

100. *Se due triangoli sono tra essi equiangoli , e hanno due lati opposti ad angoli uguali tra essi uguali , sono anche tali triangoli tra essi equilateri , ed uguali .*

DI-

DIMOSTRAZIONE.

Sieno ne' triangoli ABC , DEF gli angoli in A , B , C rispettivamente uguali agli angoli in D , E , F , e sieno uguali i lati AC , DF opposti ad angoli uguali in B , ed E . S'intenda il triangolo ABC posto sul triangolo DEF in modo, che AC combaci con DF . Essendo gli angoli in A , e D uguali, cascherà AB su DE ; e cascherà in oltre il punto B sul punto E ; altrimenti CB s'unirebbe con AB o sotto, o sopra il punto E ; e così l'angolo BCA farebbe minore, o maggiore di EFD . Ora ciò è contro l'ipotesi. Dunque il punto B casca sul punto E . E perciò combaciano insieme il lato AB con DE , il lato BC con EF , e'l triangolo ABC col triangolo DEF . Onde sono $AB = DE$, $BC = EF$, e'l triangolo ABC uguale al triangolo DEF (§ 57). Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. XXV. TEOR. XVIII.


101. *Se due triangoli ABC , DEF hanno $AB = DE$, $BC = EF$, gli angoli in A , e D uguali tra essi, e gli angoli in C , ed F della medesima specie, cioè ambedue ottusi, o acuti; sono tali triangoli uguali tra essi, e hanno gli angoli in B , e C rispettivamente uguali agli angoli in E , ed F , e la base $AC = DF$.*

DL

DIMOSTRAZIONE.

Se si nega l'essere l'angolo ABC uguale all'angolo DEF , sarà quello maggiore, o minore di questo. Sia, s'è possibile, ABC maggiore di DEF . S'intenda in B fatto l'angolo ABG uguale a DEF . Essendo i due triangoli ABG , DEF equiangoli, ed essendo $AB = DE$; sarà $BG = EF$ (§ 100), e perciò uguale a BC . Onde l'angolo BGC è uguale a BCG (§ 91). Ma gli angoli in C , ed F sono della medesima specie per l'ipotesi. Dunque anche gli uguali ad essi BGA , BGC sono della medesima specie, cioè ambidue ottusi, o acuti. Ma ciò è impossibile. Dunque è impossibile che l'angolo ABC sia maggiore dell'angolo DEF . Similmente si dimostra che ABC non è minore di DEF . Sicchè gli angoli ADC , DEF sono uguali, e conseguentemente uguali anche BCA , EFD (§ 89). Per la qual cosa, essendo i triangoli ABC , DEF equiangoli, e avendo $AB = DE$; faranno pure $AC = DF$, e 'l triangolo ABC uguale al triangolo DEF (§ 100). Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

CAP.



C A P. VI.

Delle proprietà fondamentali de' parallelogrammi, e della semplice uguaglianza sì de' parallelogrammi, che de' triangoli.

DEFINIZIONE I.

102. Si dice *diagonale*, o *diametro* d'un parallelogrammo la retta, che cogiugne i vertici di due de' suoi angoli opposti.

Così del parallelogrammo ABCD la retta Fig. 24
AC è diagonale,

DEFINIZIONE II.

103. Se nella diagonale AC di qualunque parallelogrammo ABCD si prenda ad arbitrio il punto O, e per tal punto si tirino le rette EF, GH rispettivamente parallele a' corrispondenti lati del parallelogrammo; si dividerà esso in quattro parallelogrammi AEOG, EBHO, OHCF, OFDG, de' quali i due AEOG, OHCF si diranno *i parallelogrammi, che stanno intorno la diagonale*, e gli altri due EBHO, OFDG si diranno *i supplimenti di quelli, che*

che stanno intorno la diagonale.

PROP. XXVI. TEOR. XIX.

104. *In ogni parallelogrammo sono uguali tra essi sì i lati opposti, che gli angoli opposti; e la diagonale il divide in due triangoli uguali.*

DIMOSTRAZIONE.

Rappresenti ABCD qualunque parallelogrammo, e in esso si tiri la diagonale AC. Essendo parallele AB a DC, e AD a BC (§ 35); faranno l'angolo BAC uguale a DCA, e l'angolo DAC uguale a BCA (§ 83). Onde gli angoli opposti BAD, BCD sono tra essi uguali; ed uguali sono anche gli opposti ABC, ADC (§ 89). Essendo in oltre i triangoli ABC, CDA equiangoli tra essi, ed avendo il lato AC comune; faranno il triangolo ABC = CDA, il lato AB = DC, e'l lato AD = BC (§ 100). Sicchè in ogni parallelogrammo, ec., Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

COROLLARIO I.

105. Essendo i due angoli BAD, ADC uguali a due retti (§ 83); se BAD è retto, anche ADC è retto; e conseguentemente retti sono anche gli opposti in C, e B. Dunque se un' an-

DI GEOMETRIA PIANA: 49
 angolo d' un parallelogrammo è retto , tutti
 gli altri sono anche retti.

COROLLARIO II.

106. In oltre , essendo $BC = AD$, $AB = DC$, se è $AD = DC$, il parallelogrammo è equilatero .

PROP. XXVII. TEOR. XX.

107. *I supplimenti EBHO , OFDG de' parallelogrammi , che sono intorno la diagonale d' un' altro parallelogrammo ABCD , sono tra essi uguali ,*

DIMOSTRAZIONE.

Venendo ogni parallelogrammo diviso da una sua diagonale in due triangoli uguali (§ 104) ; faranno i tre triangoli ABC AEO , OHC rispettivamente uguali a' tre ADC , AGO , OFC . Sicchè , togliendo da ABC i due AEO , OHC , e da ADC i due AGO , OFC , resteranno i supplimenti EBHO , OFDG uguali tra essi (§ 53) , Ch'è ciò , che bisognava dimostrare .

PROP. XXVIII. TEOR. XXI.

108. *I parallelogrammi ABCD , ABFE , Fig. 29
 ed i triangoli ABD , ABE , che hanno la
 Tom. II. D me.*

medesima base AB, e che sono racchiusi tra le istesse rette parallele DP, AB, sono uguali tra essi.

DIMOSTRAZIONE.

Essendo ad AB uguale sì DC, che EF (§ 104), farà $DC = EF$ (§ 51); onde, aggiugnendovi di comune CE, farà $DE = CF$ (§ 52). Sono in oltre $AD = BC$, ed $AE = BF$. Dunque i triangoli ADE, BCF sono uguali (§ 99); e perciò, tolto il comune triangolo COE, uguali faranno pure i restanti trapezj ADCO, EOBF (§ 53). Per la qual cosa, aggiugnendo a sì fatti trapezj di comune il triangolo ABO, uguali faranno i parallelogrammi ABCD, ABFE (§ 52); e conseguentemente uguali anche le metà di essi, o sieno i triangoli ABD, ABE. Ch'è quanto bisognava dimostrare.

COROLLARIO.

109. Essendo il parallelogrammo ABCD il doppio del triangolo ABD (§ 114), e'l triangolo $ABD = ABE$; farà il parallelogrammo ABCD il doppio anche del triangolo ABE. Sicchè se un parallelogrammo, e un triangolo hanno l' istessa base, e sono racchiusi tra le medesime parallele, il parallelogrammo è il doppio del triangolo.

PROP.

PROP. XXIX. TEOR. XXII.

110. I parallelogrammi $ABCD$, $EFGH$, Fig. 26 ed i triangoli ABD , EFG , che hanno le basi AB , EF uguali, e che sono racchiusi tra le medesime parallele AF , DG , sono uguali tra essi.

DIMOSTRAZIONE.

Si congiungano le rette DE , CF . Essendo ad AB uguale sì DC , che EF ; farà $DC = EF$ (§ 51). Sono di più DC , EF parallele. Dunque DE , CF sono pure parallele (§ 85); e perciò la figura $DEFC$ è un parallelogrammo (§ 35). In oltre al parallelogrammo $DEFC$ è uguale sì il parallelogrammo $ABCD$ per la base comune DC , che il parallelogrammo $EFGH$ per la base comune EF , e per essere tutti e tre tra le medesime parallele AF , DG (§ 108). Dunque i parallelogrammi $ABCD$, $EFGH$ sono tra essi uguali (§ 51); e conseguentemente uguali anche le metà di essi, o fieno i triangoli ABD , EFG . Ch'è quanto bisognava dimostrare.

PROP. XXX. TEOR. XXIII.

111. Se due triangoli ABC , ABD sono Fig. 27 uguali, hanno l'istessa base AB , e sono situati dalla medesima parte per rispetto del-

la base AB ; la retta CD , che unisce i vertici C , e D di tali triangoli, è parallela alla base AB .

DIMOSTRAZIONE.

Se si nega essere CD parallela ad AB ; si potrà pel punto C tirare un' altra retta parallela ad AB . Si tiri, s'è possibile, CO parallela ad AB , e si congiunga BO . Sarà il triangolo AOB uguale al triangolo ABC (§ 108). Ma ABC è per l'ipotesi uguale ad ABD . Dunque la parte ABO è uguale al tutto ABD (§ 51). Sicchè, essendo ciò impossibile (§ 59), impossibile è pure che CD non sia parallela ad AB . Per la qual cosa se due triangoli, ec. . Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.


PROP. XXXI. TEOR. XXIV.

Fig. 28 112. Se due triangoli ABC , DEF sono uguali, hanno le basi uguali AB , DE poste nell' istessa retta AE , e sono situati dall' istessa parte per rispetto di AE ; la retta CF , che unisce i vertici C , ed F di tali triangoli, è parallela ad AE .

DIMOSTRAZIONE.

Se si nega essere CF parallela ad AE ; si potrà pel punto C tirare un' altra retta pa-

parallela ad AE. Si tiri, s'è possibile, CO parallela ad AE, e si congiunga EO. Sarà il triangolo DOE uguale ad ACB (§ 110). Ma ACB per l'ipotesi è uguale a DEF. Dunque la parte DOE è anche uguale al tutto DFE (§ 51). Sicchè, essendo ciò impossibile; impossibile è ancora che CF non sia parallela ad AE. Per la qual cosa se due triangoli, ec.: Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.



C A P. VII.

Della teorica de' rettangoli, e quadrati.

DEFINIZIONE.

113. Un quadrato si dice *formato su d'una data retta*, se essa è suo lato. Si dice poi un rettangolo *formato da due date rette*, se tali rette formano uno de' suoi angoli.

AVVERTIMENTO.

114. Il quadrato si dice *formato su d'una retta*, perchè una retta sola basta per la sua formazione. Il rettangolo poi si dice *formato da due rette*, perchè di due rette v'è bisogno per la formazione di esso, una

per dinotare la sua lunghezza, e l'altra per dinotare la sua larghezza.

PROP. XXXII. PROBL. VIII.

115. *Data una retta terminata, formare su di essa il quadrato.*

SOLUZIONE.

Fig. 29 Sia AB la retta data.

1. S'innalzi dal punto A su AB la perpendicolare AE (§ 72); e da essa si tagli $AD = AB$ (§ 50).

2. Per gli punti B, e D si tirino BC, DC rispettivamente parallele ad AD, AB (§ 86), che s'uniscano in C.

Dico essere ABCD il quadrato cercato.

DIMOSTRAZIONE.

Imperciocchè per la costruzione ABCD è un parallelogrammo, ed ha il lato $AD = AB$, e l'angolo in A retto; onde è equilatero, e rettangolo (§§ 105, e 106), e conseguentemente è un quadrato (§ 36). Sicchè sulla retta data AB s'è formato il quadrato ABCD. Ch'è ciò, che bisognava fare, e dimostrare.

COROLLARIO.

116. Essendo in ogni quadrato uguali tutt' i lati , e retti tutti gli angoli ; è facile l' intendere che debbono combaciare e i quadrati fatti su rette uguali , ed i quadrati , che sono uguali tra essi . E perciò i quadrati formati su rette uguali sono uguali tra essi ; e quelli , che sono tra essi uguali , sono fatti su rette uguali .

PROP. XXXIII. PROBL. IX.

117. *Date due rette disuguali , costruire un rettangolo , che sia da tali rette formato.*

S O L U Z I O N E .

Sieno le rette date AB , ed L .

Fig. 30

1. Dal punto A s' innalzi su AB la perpendicolare AE (§ 72) ; e da essa si tagli $AD = L$ (§ 50) .

2. Per gli punti D , e B si tirino DC , BC rispettivamente parallele ad AB , AD (§ 86) che s' uniscano in C .

Dico essere $ABCD$ il rettangolo cercato .

D I M O S T R A Z I O N E .

Imperciocchè per la costruzione $ABCD$ è parallelogrammo , e ha i lati AD , AB di-

D 4

fu.

fuguali, e l'angolo in A retto; onde è rettangolo (§ 105), e rettangolo fatto da AB, e AD, o sia da AB, ed L (§ 113). Sicchè s'è costruito il rettangolo ABCD, formato dalle rette AB, ed L. Ch'è ciò, che bisognava fare, e dimostrare.

COROLLARIO.

118. Sicchè qualora diremo il rettangolo fatto da AB, ed L, intenderemo il rettangolo ABCD, la cui lunghezza è AB, e la larghezza è $AD = L$.

PROP. XXXIV. TEOR. XXV.

119. *Se una retta è divisa in qualunque numero di parti, uguali o disuguali che sieno, ed un'altra è indivisa, il rettangolo fatto dall'intera divisa, e dalla indivisa è uguale alla somma di tutt' i rettangoli fatti dall' indivisa, e da ciascuna parte della divisa.*

DIMOSTRAZIONE.

Fig. 31 Sia la retta AB divisa nelle parti AE; EG, GB, ed L sia la retta indivisa. Si formi da AB, e da $AD = L$ il rettangolo ABCD (§ 117); e dai punti E, e G s'innalzino su AF le perpendicolari EF, GH (§ 72). Saranno AF, EH, GC rettangoli; onde sì GH, che EF farà uguale ad AD,

AD , ovvero ad L . Ma il rettangolo AC uguaglia la somma de' rettangoli AF , EH , GC (§ 59). Dunque , essendo formati il rettangolo AC dalle rette AB , AD , o AB , ed L , il rettangolo AF dalle rette AE , AD , o AE , ed L , il rettangolo EH dalle rette EG , EF ; o EG , ed L , e' l rettangolo GC dalle rette GB , GH , o GB , ed L , farà il rettangolo fatto da AB , ed L uguale alla somma di quelli , che si formano , uno da AE , ed L , l' altro da EG , ed L , e l' altro da GB , ed L . Ch' è ciò , che bisognava dimostrare.

COROLLARIO I.

120. Se farà $L = AB$, farà il rettangolo fatto da AB , e L l' istesso , che il quadrato fatto su AB . Onde il quadrato fatto su AB è uguale alla somma de' rettangoli fatti uno da AB , ed AE , l' altro da AB , ed EG , e l' altro da AB , e GB . Sicchè se una retta è divisa in più parti , il quadrato fatto sull' intera retta è uguale alla somma de' rettangoli fatti dall' intera retta , e da ciascuna delle sue parti .

COROLLARIO II.

121. Se sarà L uguale a una delle parti di AB , per esempio uguale a BG , farà il rettangolo fatto da AB , e BG uguale alla
som.

somma de' rettangoli fatti , uno da AE , e BG , l'altro da EG , e BG , e l'altro da GB , e BG , o sia il quadrato di BG . Sicchè se una retta è divisa in più parti il rettangolo fatto dall' intera retta , e da una delle sue parti è uguale al quadrato fatto sull' istessa parte , una co' rettangoli fatti dall' istessa parte , e da ciascuna delle altre .

COROLLARIO III.

122. Se anche L farà divisa in parti ; i rettangoli fatti da AE , e L , da EG , ed L , da GB , ed L faranno uguali a tutt' i rettangoli fatti da AE , EG , GB , e da ciascuna parte di L . Sicchè se faranno AB , ed L ambedue divise in parti , il rettangolo fatto da AB , ed L uguaglierà la somma di tutt' i rettangoli fatti da ciascuna parte di AB con ciascuna di L .

COROLLARIO IV.

223. Quindi se le parti di AB , ed L faranno tutte uguali , i detti rettangoli faranno quadrati , e quadrati tutti uguali . E perchè il numero de' rettangoli fatti da AE , ed L , da EG , ed L , da GB , ed L uguaglia il numero delle parti di AB ; e 'l numero de' quadrati , che compongono ciascuno de' detti rettangoli , uguaglia il numero delle parti di L . Perciò se AB , ed L faranno ambedue

due divise in parti uguali, il rettangolo formato da AB, ed L uguaglierà la somma di tanti quadrati uguali, che avranno per lati le parti di AB, o rette ad esse uguali, quanti ne disegnerà il prodotto del numero delle parti di AB moltiplicato per quello di L.

COROLLARIO V.

124. Sicchè se farà anche $L = AB$, nel qual caso AC diverrà quadrato; farà il quadrato fatto su AB uguale alla somma di tanti quadrati uguali, che avranno per lati le parti di AB, o rette ad esse uguali, quanti ne disegnerà il prodotto del numero delle parti di AB moltiplicato per se medesimo.

PROP. XXXV. TEOR. XXVI.

125. *Il quadrato fatto sulla somma di due rette è maggiore della somma de' quadrati fatti sulle rette del doppio del rettangolo fatto dalle medesime rette.*

DIMOSTRAZIONE.

Sia AC la somma di due rette AB, BC. Sarà il quadrato di AC uguale alla somma de' rettangoli fatti uno da AC, ed AB, e l'altro da AC, e CB (§ 120). Ma di sì fatti rettangoli il primo uguaglia la somma del quadrato di AB, e del rettangolo fatto da AB, e BC, e l' secondo uguaglia la somma del quadrato di BC, e del rettangolo fatto pu.

Fig. 32

pure da AB , e BC (§ 121). Dunque il quadrato di AC è uguale alla somma de' quadrati fatti su AB , BC , e del doppio del rettangolo fatto da AB , e BC . E perciò il quadrato di AB è maggiore della somma de' soli quadrati di AB , e BC del doppio del rettangolo fatto da AB , e BC . Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. XXXVI. TEOR. XXVII.

126. Il quadrato fatto sulla differenza di due rette è minore della somma de' quadrati fatti sulle rette del doppio del rettangolo fatto dalle istesse rette.

DIMOSTRAZIONE.

Sia AB la differenza di due rette AC , BC . Sarà il quadrato di AB minore del quadrato di AC della somma del quadrato di BC , e del doppio del rettangolo fatto da AB , e BC (§ prec.); e perciò minore della somma de' quadrati AC , e CB della somma del doppio del quadrato di BC , e del doppio del rettangolo fatto da AB , e BC . Ma il doppio del quadrato di BC , unito col doppio del rettangolo fatto da AB , e BC è uguale al doppio del rettangolo fatto da AC , e CB (§ 121). Sicchè il quadrato di AB è minore della somma de' quadrati delle rette AC , CB del doppio del rettan-

go-

golo fatto da AC, e CB. Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

COROLLARIO I.

127. Sia AC la somma di due rette AB, Fig. 33
BC; farà, tagliata da AB la BD = BC,
la AD la differenza delle medesime rette
AB, BC. Essendo il quadrato di AC mag-
giore de' quadrati di AB, BC del doppio del
rettangolo fatto da AB, e BC (§ 125);
e 'l quadrato di AD minore de' quadrati di
AB, e BD, o di AB, e BC, del doppio del
rettangolo fatto da AB, e BD, o da AB, e
BC (§ prec.); farà il quadrato di AC mag-
giore del quadrato di AD del quadruplo del
rettangolo fatto da AB, e BC. Sicchè il
quadrato fatto sulla somma di due rette è
maggiore del quadrato fatto sulla differenza
di esse del quadruplo del rettangolo fatto
dalle istesse rette.

COROLLARIO II.

128. In oltre sia AC la differenza di due Fig. 34
rette AB, BC; aggiugnendovi BD = BA,
farà DC la somma delle medesime rette.
Essendo il quadrato di DC uguale ai
quadrati di AB, e BC, aggiuntovi il dop-
pio del rettangolo fatto da AB, e BC
(§ 125); ed il quadrato di AC uguale ai
quadrati di AB, e BC, toltone il doppio
del

del rettangolo fatto da AB , e BC ; farà la somma de' quadrati fatti uno su DC , e l'altro su AC il doppio de' quadrati fatti uno su AB , e l'altro su BC . Sicchè i quadrati fatti uno sulla somma di due rette, e l'altro sulla differenza sono il doppio de' quadrati fatti sulle medesime rette.

COROLLARIO III.

129. Essendo finalmente delle rette DC , CA in un caso AB la metà della somma, e BC la metà della differenza, e nell' altro caso BA la metà della differenza, e BC la metà della somma; ed essendo i quadrati di DC , e CA in ambidue i casi il doppio de' quadrati di AB , BC . E' chiaro che la somma de' quadrati fatti su due rette disuguali è il doppio de' quadrati fatti uno sulla metà della somma, e l'altro sulla metà della differenza delle istesse rette.

PROP. XXXVII. TEOR. XXVIII.

130. *Il rettangolo fatto dalla somma di due rette disuguali, e dalla differenza è uguale alla differenza de' quadrati fatti sulle medesime rette;*

DIMOSTRAZIONE.

Sieno AB , BC due rette disuguali. S'aggiun-

giunga $BD = BA$; farà di BA , BC la somma DC , e la differenza CA . Effendo il rettangolo fatto da DC , e CA uguale alla somma de' rettangoli fatti , uno da DB , o sia BA , e AC , e l'altro da BC , e CA (§ 119) ; e conseguentemente uguale alla somma de' rettangoli fatti in un caso uno da BA , e AC , e l'altro da AB , e BC , toltone il quadrato di BC , e nell' altro caso uno da BC , e CA , e l'altro da CB , e BA , toltone il quadrato di AB ; ed effendo i due rettangoli fatti in un caso uno da AB , e BC , e l'altro BA , e AC uguali al quadrato di AB , e nell' altro caso uno da CB , e BA , e l'altro da BC , e CA uguali al quadrato di BC . Sarà il rettangolo fatto da DC , e CA uguale in ambidue i casi alla differenza de' quadrati fatti su AB , e BC . Ch' è ciò , cha bisognava dimostrare .

COROLLARIO.

131. Effendo delle rette DC , CA in un caso AB la metà della somma , e BC la metà della differenza , e nell' altro caso AB la metà della differenza , e BC la metà della somma . E' chiaro che il rettangolo fatto da due rette disuguali DC , CA è uguale alla differenza de' quadrati fatti uno sulla metà della somma delle medesime rette , e l'altro sulla metà della differenza .

GAP.



C A P. VIII.

*Della quantità de' quadrati formati su
i lati de' triangoli.*

PROP. XXXVIII. TEOR. XXIX.

132. *In ogni triangolo rettangolo il quadrato fatto sull'ipotenusa è uguale alla somma de' quadrati fatti su i cateti.*

D I M O S T R A Z I O N E.

Fig. 35 Sia ABC triangolo rettangolo in B. Si facciano su i lati AB, BG, CA i quadrati AH, CF, AD (§ 115). Per B si tiri BL parallela a GD (§ 86); e s'uniscano le rette BD, AG.

Essendo retto sì l'angolo ABC, che CBF; farà la somma di ABC, CBF uguale a due retti; onde AB, BF formano una retta continuata (§ 77). E perciò, per le parallele BF, CG, l'intera AF è parallela a GC. Similmente si dimostra essere l'intera CH parallela ad AI. In oltre gli angoli DCA, BCG sono uguali (§ 61); aggiuntovi di comune l'angolo AGB, uguali faranno anche DCB, ACG (§ 52). Sono di più
DC

$DC = AC$, $CB = CG$. Dunque uguali sono anche i triangoli DCB , ACG (§ 98). Di vantaggio il rettangolo LC , e 'l triangolo DCB hanno l'istessa base DC , e sono racchiusi tra le istesse parallele BL , DC . Dunque il rettangolo LC è il doppio del triangolo DCB (§ 109). Similmente il quadrato CF , e 'l triangolo ACG hanno l'istessa base CG , e sono racchiusi tra le parallele AF , CG . Onde il quadrato CF è il doppio del triangolo ACG (§ 109). Per la qual cosa, essendo uguali i triangoli DCB , ACG , uguali faranno ancora il rettangolo LC , e 'l quadrato CF . Dell'istesso modo si dimostra essere il rettangolo AL uguale al quadrato AH . Sicchè la somma de' rettangoli AL , LC , o sia il quadrato AD dell'ipotenusa AC è uguale alla somma de' quadrati AH , CF , fatti su i cateti AB , BC . Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. XXXIX. TEOR. XXX.

133. *In ogni triangolo ottusangolo il quadrato fatto sul lato opposto all'angolo ottuso è maggiore della somma de' quadrati fatti su gli altri due lati del doppio del rettangolo fatto da uno di questi lati, e dalla porzione, che l'aggiugne la perpendicolare calata dal vertice dell'angolo opposto.*

DIMOSTRAZIONE.

Fig. 36 Sia ABC triangolo ottusangolo in B . Dal punto A si cali su CB prolungata in D la perpendicolare AD (§ 73). Sarà il quadrato di AC uguale alla somma de' quadrati fatti su CD , DA (§ prec.). Ma il quadrato di CD è maggiore de' quadrati fatti su CB , BD del doppio del rettangolo fatto da CB , e BD (§ 125). Dunque il quadrato fatto su AC è anche maggiore de' quadrati fatti su CB , BD , DA ; o sia de' quadrati fatti su CB , BA del doppio del rettangolo fatto da CB , e BD . Ch' è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. XL. TEOR. XXXI.

134. *In ogni triangolo il quadrato fatto sul lato opposto a un'angolo acuto è minore della somma de' quadrati fatti su gli altri due lati del doppio del rettangolo fatto da uno di questi lati, e dalla porzione adiacente all'angolo acuto, che taglia dal medesimo lato la perpendicolare calata dal vertice dell'angolo opposto.*

DIMOSTRAZIONE.

Fig. 37 Sia ABC triangolo, che ha l'angolo in C acuto. Da B si cali su AC la perpendicolare BD (§ 73). Sarà il quadrato fatto

to

to su AB uguale alla somma de' quadrati fatti su AD , DB (§ 132). Ma il quadrato fatto su AD è minore de' quadrati fatti su AC , CD del doppio del rettangolo fatto da AC , e CD . (§ 126). Dunque anche il quadrato fatto su AB è minore della somma de' quadrati fatti su AC , CD , DB , o sia de' quadrati fatti su AC , CB del doppio del rettangolo fatto da AC , e CD . Ch' è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. XLI. TEOR XXXII.

135. *L'angolo, che formano due lati d'un triangolo è ottuso, retto, o acuto, secondochè il quadrato fatto sul lato opposto a tale angolo è maggiore, uguale, o minore della somma de' quadrati fatti su gli altri due lati.*

DIMOSTRAZIONE.

Esprima ABC qualsivoglia triangolo. Dal Fig. 38 punto B s' innalzi su BC la perpendicolare BD , ed uguale ad AB ; e si congiunga CD . Essendo $AB = BD$, farà la somma de' quadrati fatti su AB , BC uguale alla somma de' quadrati fatti su DB , BC , o sia al quadrato di DC (§ 132). Onde secondochè il quadrato di AC farà maggiore, uguale, o minore de' quadrati fatti su AB , BC , farà anche il quadrato di AC maggiore, uguale, o minore del quadrato di CD ; e perciò fa-

rà AC maggiore, uguale, o minore di CD, e conseguentemente l'angolo ABC farà maggiore, uguale, o minore dell'angolo retto CBD (§ 19); cioè l'angolo ABC farà ottuso, retto, o acuto. Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.



C A P. IX.

Si sciolgono alcuni problemi, che appartengono alla teorica de' quadrati, e de' rettangoli.

PROP. XLII, PROBL. X.

136. *Dati più quadrati, trovarne un' altro, che sia uguale alla somma di essi.*

S O L U Z I O N E.

Sieno A, B, C i lati de' quadrati dati.

Fig. 39 1. Si faccia l'angolo retto LMN; e tagliate $MD = A$, $ME = B$, s'unisca DE.

2. Si taglino $MG = DE$, $MF = C$ (§ 50), e s'unisca FG.

Dico essere FG il lato del quadrato cercato.

DIMOSTRAZIONE.

Imperciocchè il quadrato fatto su FG uguaglia la somma de' quadrati fatti su FM, MG (§ 132), o su C, e DE, o su C, EM, MD, e per conseguenza su C, B, A. Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. XLIII. PROBL. XI.

137. *Dati due quadrati disuguali, trovarne un' altro, che sia uguale alla differenza di essi.*

SOLUZIONE.

Sieno A, e B i lati de' quadrati dati.

Si faccia l'angolo retto LMN; e, tagliate MP = B, PO = A, si descriva col centro P, e coll' intervallo PO il cerchio OQ (§ 48.), che interseca colla periferia LM in Q. Fig. 40

Dico essere MQ il lato del quadrato cercato.

DIMOSTRAZIONE.

Imperciocchè, congiunta PQ, il quadrato fatto su MQ uguaglia la differenza de' quadrati fatti su QP, PM, o su PO, PM, o su A, e B. Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. LXIV. PROBL. XII.

Fig. 41 138. *Data qualunque retta AB, prolungarla in D in modo, che il rettangolo fatto da AD, DB sia uguale al quadrato fatto su AB.*

S O L U Z I O N E.

1. Si divida AB in due parti uguali in O (§ 71).
2. Dal punto B s'innalzi su AB la perpendicolare BC (§ 72), ed uguale ad OB; e si congiunga AC.
3. Si prolunghi AB in D, finchè sia $OD = AC$.

Dico essere AD la retta cercata.

D I M O S T R A Z I O N E.

Imperciocchè il rettangolo fatto da AD; e DB è uguale alla differenza de' quadrati fatti su OD, OB (§ 130°); o su AC, BC; e conseguentemente il rettangolo fatto da AD, e DB è uguale al quadrato di AB, Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. XLV. TEOR. XIII.

139. *Data una retta, dividerla in un punto in modo, che il rettangolo fatto dall'intera retta, e da una delle sue parti sia uguale al quadrato fatto sull'altra parte.*

So:

S O L U Z I O N E .

Sia AB la retta data.

Fig. 42

1. Si prolunghi AB in D in modo, che sia il rettangolo fatto da AD , DB uguale al quadrato di AB (§ prec.).


2. Da AB si tagli $BC = BD$ (§ 50).

Dico. essere il rettangolo fatto da BA , e AC uguale al quadrato fatto su BC .

D I M O S T R A Z I O N E .

Imperciocchè la somma de' rettangoli fatti da AB , e EC , e da BA , e AC è uguale al quadrato fatto su AB (§ 120); e perciò uguale al rettangolo fatto da AD , e DB , o sia alla somma del rettangolo fatto da AB , e BD , o da AB , e BC , e del quadrato fatto su BD , o su EC (§ 121). Toltone il comune rettangolo fatto da AB , e BC , farà il rettangolo fatto da BA , e AC uguale al quadrato fatto su BC (§ 53). Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

Fine del primo Libro.



LIBRO II.

Della teorica del Cerchio.



C A P. I.

*Del sito , che ha il centro nel cerchio ,
e del modo di trovarlo .*



PROP. I. TEOR. I.

Fig. 43 140. *S' intersechino le due corde AB , CD
di qualsivisia cerchio ACBD . Dico I. che in
AB è il centro , se essa divide CD in due
parti uguali , e ad angoli retti ; II. che se
AB passa pel centro , e divide CD in due
parti uguali , la divide pure ad angoli retti ;
III. che se AB passa pel centro , e divide
CD ad angoli retti , la divide anche in
due parti uguali ,*

DIMOSTRAZIONE.

I. Sia , s'è possibile , il centro in P fuori
di

di AB. Si congiungano le rette PC, PE, PD. Avendo i due triangoli PEC, PED il lato CE = ED, il lato EP comune, e la base PC = PD, come raggi; saranno gli angoli PEC, PED uguali (§ 99), e per conseguenza retti. Onde l'angolo PEC uguaglia OEC (§ 61). Ma ciò è impossibile. Dunque è impossibile che il centro sia fuori di AB.

II. Sia il punto O della retta AB il centro. Si congiungano OC, OD. Essendo ne' triangoli OEC, OED il lato CE = ED, il lato OE comune, e la base OC = OD (§ 40); saranno gli angoli OEC, OED uguali (§ 99), e per conseguenza retti. Sicchè AB divide CD ad angoli retti.

III. Avendo i triangoli OEC, OED l'angolo OEC uguale ad OED, perchè retti per l'ipotesi, l'angolo OCE uguale ad ODE, perchè angoli alla base del triangolo isoscele COD, e conseguentemente l'angolo COE uguale a DOE (§ 89), e'l lato OE comune; farà EC = ED (§ 100). Sicchè AB divide CD in due parti uguali. Ch'è quanto bisognava dimostrare.

PROP. II. TEOR. II.

141. *Se da un punto esistente dentro d'un cerchio si possono tirare alla periferia più di due rette uguali, un sì fatto punto è il centro.*

DI.

DIMOSTRAZIONE.

Fig.44. Sia il punto O esistente dentro del cerchio ACG , da cui si possono tirare tre rette OA , OB , OC uguali tra esse. S'uniscano le rette AB , BC , e si dividano in due parti uguali in D , ed F ; indi per gli punti D , e O si tiri DE , e per gli punti F , O si tiri FG . Essendo il lato $AD = DB$, il lato DO comune, e la base $AO = OB$, faranno gli angoli ODA , ODB uguali (§ 19), e per conseguenza retti (§ 21). Sicchè DE divide AB in due parti uguali, e ad angoli retti; e perciò in DE è il centro (§ prec.). Similmente si dimostra essere il centro in FG . Ma il centro è un punto solo. Dunque è il punto O , comune alle due DE , FG . Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. III. PROBL. I.

142, *Dato un cerchio, trovare il suo centro.*

SOLUZIONE.

Fig.43 Sia ACD il cerchio dato.

1. Si prendano nella periferia due punti C , e D ad arbitrio, e s'uniscano con CD .
2. Si divida CD in due parti uguali in E ; e per E si tiri AB perpendicolare a CD .
3. Si

3. Si divida AB in due parti uguali in O .
Dico che O è il centro cercato.

D I M O S T R A Z I O N E .

Imperciocchè AB divide CD in due parti uguali, e ad angoli retti. Dunque in AB è il centro (§ 140); e conseguentemente è il punto O , in cui AB è divisa in due parti uguali. Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. IV. PROBL. II.

143. *Dato un' arco qualunque di cerchio, trovare il centro di sì fatto cerchio.*

S O L U Z I O N E .

Sia ABC l'arco dato. Fig. 45

1. Si prendano nell' arco ad arbitrio tre punti A, B, C , e si congiungano le rette AB, BC .

2. Divise AB, BC in due parti uguali in D, E , s'innalzino da D, E su AB, BC le perpendicolari DF, EG , e si prolunghino, finchè s'intersechino in O .


Dico essere O il centro cercato.

DIMOSTRAZIONE.

Dividendo DF , EG le rette AB , BC in due parti uguali, e ad angoli retti, sarà il centro del cerchio sì in DF , che in EG (§ 140). Ma il centro è un punto solo. Dunque è il punto O , comune a DF , EG . Ch' è ciò, che bisognava dimostrare.

COROLLARIO.

144. Se col centro O , e coll' intervallo d' una delle rette, che da O si possono tirare alli punti A , B , C , si descriverà il cerchio, si compirà quello, della cui periferia l' arco ABC è porzione. E perciò è chiaro il modo di descrivere un cerchio, che passi colla sua periferia per tre punti dati A , B , C non esistenti in una linea retta.



C A P. II.

*Dell' ordine, che serbano nella grandezza
le rette tirate alla periferia
di qualunque cerchio.*

DEFINIZIONE.

145. Si dirà *distanza dal centro* d' una corda d' un cerchio la perpendicolare calata su di essa dal centro.

PROP. V. TEOR. III.

146. Di tutte le infinite rette, che *Fig. 46* possono tirare alla periferia di qualunque cerchio $BDCE$ da qualsivoglia punto A , esistente nell' istesso cerchio, e diverso dal centro O , 1.° la massima è AB , che passa pel centro O ; 2.° la minima è AC , restante porzione del diametro BC ; 3.° ognuna delle altre è maggiore di quelle, che sono più di essa distanti dalla massima; 4.° e di sì fatte rette ognuna non può averne, se non se un' altra, che le sia uguale.

DIMOSTRAZIONE.

Si tiri AD ; e, congiunto il raggio DO ,
fi fac.

si faccia l'angolo AOE uguale ad AOD ; e s'unisca AE .

I. Essendo $OB = OD$; aggiuntavi di comune AO , sarà AB uguale alla somma di AO , OD , e perciò maggiore di AD (§ 68). Similmente si dimostra essere AB maggiore d'ogni altra, che da A si può tirare alla periferia. Dunque di tutte le infinite rette, che da A si possono tirare alla periferia, la massima è AB .

II. Essendo $OC = OD$ (§ 40), e perciò minore di OA , AD (§ 63); toltane la comune OA , sarà AC minore di AD . Similmente si dimostra essere AC minore d'ogni altra, che da A si può tirare alla periferia. Dunque di tutte le infinite rette, che da A si possono tirare alla periferia, la minima è AC .

III. Essendo AD base dell'angolo AOD , sarà essa maggiore, o minore, secondochè l'angolo AOD sarà maggiore, o minore (§ 19), cioè secondochè sarà DA più vicina, o più lontana da AB . Dunque ogni retta, che si tira da A alla periferia, diversa da AB , è maggiore di quelle, che sono più di essa distanti da AB .

IV. Finalmente essendo uguali gli angoli AOE , AOD , ed avendo il lato $OE = OD$, e 'l lato AO comune; sarà la base $AE = AD$ (§ 19). Or se da A si tira un'altra retta alla periferia, essa sarà più, o meno di AD vicina ad AB ; e perciò sarà mag-

maggiore , o minore di AD . Sicchè ogni retta tirata da A alla periferia , e diversa da AB , ed AC , non può averne , se non se un' altra sola , che le sia uguale . Ch' è quanto bisognava dimostrare .

PROP. VI. TEOR., IV.

147. Di tutte le infinite rette , che si possono tirare sì alla parte concava , che alla parte convessa della periferia di qualunque cerchio $EDFG$ da qualsivis punto A esistente Fig-47 fuori dell'istesso cerchio , 1.º la massima è la retta AB , che passa pel centro O ; 2.º la minima è AC ; 3.º ognuna delle altre , se giungono alla parte concava , è maggiore di quelle , che sono più di essa distanti dalla massima AB ; 4.º se giungono alla parte convessa , è minore di quelle , che sono più di essa distanti dalla minima AC ; 5.º e di tali rette ognuna non può averne ; se non se un' altra sola , che le sia uguale .

DIMOSTRAZIONE.

Si tiri qualunque retta AD . Si congiungano i raggi OD , OE ; e , fatti gli angoli AOF , AOG rispettivamente uguali ad AOD , AOE , si congiungano AF , AG .

I. Essendo $OB = OD$; aggiuntavi di comune AO , farà AB uguale alla somma di AO , OD (§ 52) , e perciò maggiore di AD (§ 63.) , e molto più maggiore di AE ,

AE. Similmente si dimostra essere **AB** maggiore d'ogni altra retta, che da **A** si può tirare e alla parte concava, e alla parte convessa della periferia. Sicchè di tutte le infinite rette, che da **A** si possono tirare e alla parte concava, e alla parte convessa della periferia **EDFG**, la massima è **AB**.

II. Essendo **AO** minore della somma di **AE**, **EO** (§ 63); toltene le uguali **OC**, **OE**; farà **AC** minore di **AE** (§ 55), e molto più minore di **AD**. Similmente si dimostra essere **AC** minore d'ogni altra, che da **A** si può tirare e alla parte concava, e alla parte convessa della periferia. Dunque di tutte le infinite rette, che da **A** si possono tirare e alla parte concava, e alla parte convessa della periferia **EDFG**, la minima è **AC**.

III. Essendo **AD** base dell'angolo **AOD**; farà essa maggiore, o minore, secondochè l'angolo **AOD** farà maggiore, o minore (§ 19), cioè secondochè **AD** farà più, o meno vicina ad **AB**. Dunque ogni retta, che da **A** si può tirare alla parte concava della periferia, diversa da **AB**, è maggiore di quelle, che sono più di essa distanti da **AB**.

IV. Essendo **AE** base dell'angolo **AOE**; farà essa pure maggiore, o minore, secondochè l'angolo **AOE** farà maggiore, o minore (§ 19), cioè secondochè **AE** farà più, o meno distante da **AC**. Dunque ogni ret-

ret-

retta, che da A si può tirare alla parte convessa della periferia, diversa da AC, è minore di quelle, che sono più di essa distanti da AC.

V. Finalmente, essendo gli angoli AOF, AOG rispettivamente uguali ad AOD, AOE, ed avendo i lati rispettivamente uguali, faranno $AF = AD$, $AG = AE$ (§ 19). Or se si tira da A un'altra retta alla periferia, essa, giugnendo alla parte concava, è maggiore, o minore di AD, secondochè è più, o meno di AD vicina ad AB, e, giugnendo alla parte convessa, è minore, o maggiore di AE, secondochè è più, o meno di AE vicina ad AC. Sicchè ogni retta, che si può tirare da A alla parte e concava, e convessa della periferia, diversa da AB, non può averne, se non se un'altra, che le sia uguale. Ch'è quanto bisognava dimostrare.

PROP. VII. TEOR. V.

148. *Di tutte le infinite corde, che si possono tirare in un cerchio, 1.º la massima è il diametro; 2.º ognuna delle altre è maggiore di quelle, che sono più di essa distanti dal centro; 3.º quelle, che sono uguali tra esse, hanno uguali distanze dal centro; 4.º e quelle, che hanno uguali distanze dal centro, sono tra esse uguali.*

DIMOSTRAZIONE.

Fig. 48 Sieno nel cerchio $ABCD$ tirate due corde AB , CD ; e su di esse sieno calate dal centro O le perpendicolari OE , OF . Saranno AB , CD doppie rispettivamente di AE , DF (§ 140). Si congiungano di più i raggi OA , OD .


I. Essendo l'angolo AEO retto; sarà l'angolo AOE minore del retto (§ 89). Onde AO è maggiore di AE (§. 96), e conseguentemente il diametro maggiore di AB . Similmente si dimostra essere il diametro maggiore d'ogni altra corda. Sicchè di tutte le infinite corde, che si possono tirare in un cerchio, il diametro è la massima.

II. Essendo il quadrato di AE minore del quadrato di AO di quant'è il quadrato di OE ; sarà il quadrato di AE maggiore, o minore, secondochè il quadrato di OE sarà minore, o maggiore. E perciò AE , e conseguentemente AB è maggiore, o minore, secondochè OE è minore, o maggiore. Dunque ogni corda diversa dal diametro è maggiore d'ogni altra, ch'è più di essa distante dal centro.

III. Sia $AB = DG$. Sarà $AE = DF$. Essendo uguali al quadrato di AO i quadrati di AE , EO , e al quadrato di DO i quadrati di DF , FO (§ 132); ed essendo i quadrati di AO , OD uguali tra essi:

fi ; farà anche la somma de' quadrati di AE , EO uguale alla somma de' quadrati di DF , FO . Onde , toltine i quadrati uguali di AE , DF (§. 116), uguali saranno anche i quadrati di OE , OF ; e conseguentemente uguali saranno pure le rette OE , OF (§ 116) . Sicchè le corde uguali AB , CD hanno distanze uguali dal centro .

IV. Sia finalmente $OE = OF$. Essendo la somma de' quadrati di AE , EO uguale alla somma de' quadrati di DF , FO ; faranno , toltine i quadrati uguali di OE , OF (§ 116) , uguali i quadrati di AE , DF (§ 53) . E perciò uguali saranno le rette AE , DF (§ 116) , e conseguentemente uguali le corde AB , DC . Sicchè uguali sono le corde , che hanno uguali distanze dal centro . Ch'è quanto bisognava dimostrare .



C A P. III.

Delle tangenti de' cerchi , e del modo di tirarle .

DEFINIZIONE.

149. Una retta si dice *tangente* d'un cerchio , se , esistente fuori del cerchio , incontra la sua periferia in un solo punto , e prolun-

lungata cade interamente fuori dell' istesso cerchio . Il punto , in cui la tangente incontra la periferia , si dice *punto del contatto* .

PROP. VIII. TEOR. VI.

150. *Ogni tangente d' un cerchio forma col raggio tirato al punto del contatto un angolo retto .*

— DIMOSTRAZIONE .

Fig. 49 Sia AB una retta qualunque , che incontra la periferia BCF ne' punti B , e C . Si concepisca che la retta AB si muova intorno al punto A , allontanandosi continuamente dal centro O , finchè divenghi tangente del cerchio . In sì fatto movimento della retta AB i punti B , e C continuamente s' avvicineranno , e finalmente s' uniranno nel punto del contatto ; e , tirati i raggi OB , OC , l' angolo BOC continuamente si diminuirà , e finalmente diverrà nullo . Ma l' angolo ACO deve sempre uguagliare la somma di COB , OBC (§ 88) . Dunque , quando AB diviene tangente , l' angolo ACO diviene uguale ad OBC , e perciò uguale ad OCB , e conseguentemente retto . Per la qual cosa ogni tangente , ec. . Ch' è ciò , che bisognava dimostrare .

A V V E R T I M E N T O .

151. Si noti che tra la tangente d' un cerchio , e la periferia non può passarvi una retta tirata dal punto del contatto . In fatti sia AE tangente del cerchio BCF nel punto D ; e si tiri dal punto D del contatto , s'è possibile , la retta DG , che passi tra la tangente , e la periferia . Essendo , congiunto il raggio OD , l'angolo ODA retto , farà l'angolo ODG acuto . Onde OD non è perpendicolare a DG . Si cali dunque su DG dal centro O la perpendicolare OX . Sarà OX minore di OD (§ 96) , o sia di OL ; cioè il tutto minore della parte . Ma ciò è impossibile (§ 59) . Dunque è impossibile poter tirare dal punto del contatto D una retta , che passi tra la tangente , e la periferia .

C O R O L L A R I O .

152. Quindi l'angolo mistilineo , fatto dalla tangente , e dalla periferia , e chiamato da' Geometri angolo del contatto , non è divisibile da una linea retta .

PROP. IX. TEOR. VII.

153. *Se una retta esistente fuori d' un cerchio incontra la periferia in un punto .*

F 3

ed

ed è perpendicolare al raggio tirato all'istesso punto, si fatta retta è tangente del cerchio nel medesimo punto.

DIMOSTRAZIONE.

Incontri AD la periferia del cerchio BCF nel punto D., e sia perpendicolare al raggio OD. Si prolunghi AD verso E. Essendo OD perpendicolare ad AE, farà OD la minima di tutte le rette, che da O si possono tirare a tutt' i punti di AE, diversi da D (§ 97). Onde tutt' i punti di AE, diversi da D, sono fuori del cerchio. E perciò AE è tangente del cerchio nel punto D. Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. X. PROB. III.

154. Dato un punto fuori d' un cerchio, tirare dal punto dato una retta, che sia tangente del cerchio.

SOLUZIONE.

Fig. 50 Sieno A il punto dato, e BCE il dato cerchio.

1. Si trovi il centro O (§ 142), e si congiunga OA, che interseca la periferia in C.
2. Col centro O, e coll' intervallo OA si descriva l' arco circolare AD; e dal punto C s' innalzi su OA la perpendicolare CD, che

che incontra l' arco AD in D.

3. Dal punto D al punto O si tiri DO, che interseca la periferia CBE in B.

4. Finalmente dal punto A al punto B si tiri la retta AB.

Dico che AB è la tangente cercata.

DIMOSTRAZIONE.

Essendo ne' due triangoli ABO, DCO il lato $AO = OD$, $OB = OC$, e l' angolo $AOB = DOC$; farà l'angolo $ABO = DCO$ (§ 98). Ma l'angolo DCO è retto per la costruzione. Dunque anche ABO è retto. E perciò AB è tangente del cerchio nel punto B (§ 153). Sicchè dal dato punto A s' è tirata la retta AB, tangente del cerchio BCE. Ch' è ciò, che bisognava fare, e dimostrare.

AVVERTIMENTO.

155. Se occorre di dover tirare la tangente per un punto della periferia, essa si ha facilmente, tirando per l' estremo del raggio, che giugne in tale punto, la perpendicolare al medesimo raggio.



C A P. IV.

*Degli angoli formati e ai centri,
e alle periferie de' cerchi.*

DEFINIZIONE I.

156. Si dice *angolo al centro* quello , il cui vertice è nel centro del cerchio ; si dice poi *angolo alla circonferenza* quello , il cui vertice è in un punto della circonferenza.

DEFINIZIONE II.

157. Si dice *angolo nella porzione* quello , il cui vertice è in un punto dell' arco della porzione , e i cui lati passano per gli estremi della corda.

PROP. XI. TEOR. VIII.

158. *Ne' cerchi uguali gli angoli uguali, fatti ne' centri , appoggiano ad archi uguali , e al contrario.*

DIMOSTRAZIONE.

Fig. 51. Sieno i cerchi AEB , CFD uguali.

I.

I. Sieno gli angoli AOB , CPD fatti ne' centri uguali tra essi. S'intenda il cerchio AEB posto sul cerchio CFD in modo, che caschino il centro O sul centro P , e l' raggio OA sul raggio PC ; cascheranno, per l'uguaglianza degli angoli AOB , CPD , il raggio OB su PD , e per l'uguaglianza de' cerchi, e conseguentemente de' raggi, il punto A sul punto C , e'l punto B sul punto D . Onde l'arco AB combacia coll' arco CD . Ma le grandezze, che combaciano, sono uguali (§ 57). Dunque l' arco AB è uguale all' arco CD .

II. Sia l' arco AB uguale all' arco CD : Se si nega essere l' angolo AOB uguale a CPD ; sarà AOB maggiore, o minore di CPD . Sia, s' è possibile, AOB maggiore di CPD . S'intenda fatto in O l' angolo $AOL = CPD$. Sarà l' arco AL uguale a CD per la prima parte. Ma l' arco AB è per l' ipotesi uguale a CD . Dunque l' arco AL è uguale anche ad AB (§ 51): Il che è impossibile (§ 59). Dunque è impossibile che sia l' angolo AOB maggiore di CPD . Similmente si dimostra non essere AOB minore di CPD . Sicchè l' angolo AOB è uguale a CPD . Ch' è quanto bisognava dimostrare.

COROLLARIO I.

159. Essendo ne' cerchi uguali uguali gli archi , a' quali appoggiano angoli uguali fatti ne' centri , ed uguali gli angoli fatti ne' centri ; qualora appoggiano ad archi uguali : in un' istesso cerchio faranno pure uguali gli archi , a' quali appoggeranno angoli uguali fatti nel centro , ed uguali gli angoli fatti nel centro , qualora appoggeranno ad archi uguali.

AVVERTIMENTO I.

160. Si noti che dal corrispondere in ogni cerchio sempre ad archi uguali angoli al centro uguali , e ad angoli uguali archi uguali , n' è derivato che 'ogni angolo si dice pure di tanti gradi , quanti ne contiene l' arco circolare , che tramezza tra i suoi lati , e ch'è descritto con prendere per centro il vertice dell'angolo , e per raggio qualunque lunghezza.

COROLLARIO II.

Fig. 52 161. S' intersechino AB , CD ad angoli retti ; e si descriva col centro O , e con qualunque raggio OE il cerchio $EFGH$ (§ 48) . Essendo uguali i quattro angoli AOC , COB , BOD , DOA (§ 61) , uguali faranno pure
re

re i quattro archi EF, FG, GH, HE. Onde ognuno di sì fatti archi è la quarta parte della periferia, e conseguentemente di 90 gradi. Sicchè ogni angolo retto è di 90 gradi, e conseguentemente due angoli retti di 180°, e quattro angoli retti di gradi 360.

AVVERTIMENTO II.

162. Si noti di vantaggio che ancorchè Fig. 53
gli angoli ABC, DEF sieno di tanti gradi, quanti ne contengono gli archi GH, IK, e sia conseguentemente l'angolo ABC il doppio, il triplo, ec. dell'angolo DEF, secon-
dochè il numero de' gradi dell'arco GH è il doppio, il triplo, ec. del numero de' gradi dell'arco IK: nondimeno se gli archi GH, IK sono descritti co' raggi disuguali; perchè i gradi d'un'arco in tal caso sono di disuguali grandezze de' gradi dell'altro; si conoscerà essere l'angolo ABC il doppio, il triplo, ec. dell'angolo DEF dal conoscere essere il numero de' gradi dell'arco GH il doppio, il triplo, ec. del numero de' gradi dell'arco IK, ma non già dall'essere l'arco GH il doppio, il triplo, ec. dell'arco IK. Se poi gli archi LM, IK sono descritti co' raggi uguali; perchè in tale caso i gradi d'un'arco sono d'uguale grandezza de' gradi dell'altro; si conoscerà l'angolo ABC essere il doppio, il triplo, ec. dell'an-

angolo DEF non solamente dal conoscere essere il numero de' gradi dell'arco LM il doppio, il triplo, ec. del numero de' gradi dell'arco IK, ma ben anche dall'essere l'arco LM il doppio, il triplo, ec. dell'arco IK. Quindi è che i Geometri prendono per misure degli angoli continuamente gli archi circolari, che ne determinano i gradi di essi, descritti però co' raggi uguali, vale a dire archi circolari appartenenti all'istesso cerchio, o a cerchi uguali.

AVVERTIMENTO III.

Fig. 51 163. Si noti finalmente che, tirate ne' cerchi uguali AEB, CFD le corde AB, CD, se farà la corda $AB = CD$, farà anche l'angolo AOB uguale all'angolo CPD (§ 19), e conseguentemente l'arco AB uguale all'arco CD: e se farà l'arco AB uguale all'arco CD; perchè l'angolo AOB è uguale all'angolo CPD (§ 158), farà la corda $AB = CD$ (§ 19).

COROLLARIO III.

164. Dunque ne' cerchi uguali le corde uguali tagliano archi uguali, e gli archi uguali hanno corde uguali.

PROP.

PROP. XII. TEOR. IX.

165. L'angolo AOB al centro di qualun- Fig. 54
que cerchio ACB è il doppio dell'angolo^e 55
 ACB fatto alla circonferenza, appoggiando
ambidue all'istesso arco AB .

D I M O S T R A Z I O N E.

Dal punto C al centro O si tiri CO , e si
prolungi in D ; caderà essa o tra i lati
dell'angolo AOB , o fuori. Nel caso

I. Essendo de' triangoli isosceli AOC , Fig. 54
 BOC il lato CO prolungato in D ; faranno
l'angolo esterno AOD il doppio di ACO ,
e BOD il doppio di BCO (§ 88). Onde
la somma di AOD , BOD , o l'intero AOB
è il doppio della somma di ACO , OCB ,
o dell'intero ACB . Nel caso

II. Essendo de' triangoli isosceli BOC , Fig. 55
 AOC il lato CO prolungato in D ; faranno
tutto l'angolo BOD il doppio di tutto l'an-
golo BCO , e la parte del primo AOD an-
che il doppio della parte dell'altro ACO
(§ 88). Sicchè il restante del primo AOB
farà pure il doppio del restante del secondo
 ACB (§ 64). Per la qual cosa l'angolo
al centro, ec., Ch' è ciò, che bisognava
dimostrare,

COROLLARIO I.

166. Corrispondendo in ogni cerchio agli angoli uguali fatti nel centro archi uguali, e ad archi uguali angoli uguali nel centro; corrisponderanno anche in ogni cerchio ad angoli uguali fatti nella periferia archi uguali, e ad archi uguali angoli alla periferia uguali.

COROLLARIO II.

167. Essendo l'angolo AOB di tanti gradi, quanti ne contiene l'arco AB; sarà l'angolo ACB alla periferia di tanti gradi, quanti ne conterrà la metà dell'arco AB. Onde gli angoli alla periferia d'un' istesso cerchio sono di tanti gradi, quanti ne contengono le metà degli archi, ai quali appoggiano; e conseguentemente vengono misurati non dagli archi interi, ai quali appoggiano, ma dalle metà di essi.

COROLLARIO III.

168. Appoggiando tutti gli angoli fatti in un' istessa porzione di cerchio all' istesso arco, tutti sono dell' istesso numero di gradi, e conseguentemente uguali.

CO.

COROLLARIO IV.

169. Essendo di più la metà della mezza periferia di 90° , una porzione minore della metà della mezza periferia meno di 90° , e una porzione maggiore della metà della mezza periferia più di 90° . Dunque ogni angolo fatto nel mezzo cerchio è retto; ogni angolo fatto in una porzione maggiore del mezzo cerchio è minore del retto, e per conseguenza acuto; ed ogni angolo fatto in una porzione minore del mezzo cerchio è maggiore del retto, e conseguentemente ottuso.

COROLLARIO V.

170. Sia ABCD un quadrilatero qualun- Fig. 56
que iscritto nel cerchio ABCD. Sarà la somma degli angoli opposti in A, e C di tanti gradi, quanti ne contiene la metà della somma degli archi BCD, BAD, o la metà dell'intera periferia, e perciò uguale a due angoli retti. Similmente si conosce essere uguale a due retti la somma degli angoli opposti in B, e D. Sicchè in ogni quadrilatero iscritto in un cerchio la somma di due angoli opposti è uguale a due retti.

COROLLARIO VI.

Fig. 57 171. S' intersechino le corde AD, BC nel punto O, diverso dal centro. Sarà, congiunta la retta BD, l'angolo AOB uguale alla somma degli angoli ADB, DBC (§ 88), e perciò di tanti gradi, quanti ne contiene la metà della somma degli archi AB, CD.

COROLLARIO VII.

Fig. 58 172. S' incontrino finalmente le corde AE, CD prolungate nel punto B fuori del cerchio. Sarà, congiunta AD, l'angolo ABC uguale alla differenza de' due ADC, DAB (§ 88), e perciò di tanti gradi, quanti ne contiene la metà della differenza de' due archi AC, DE.

A V V E R T I M E N T O.

Fig. 59 173. Si noti che descrivendo un cerchio, che abbia per diametro l'ipotenusa AC di qualunque triangolo rettangolo ABC, passerà esso colla sua periferia pel punto B; altrimenti se tagliasse il lato AB in qualunque altro punto D; congiunta la retta CD, farebbe l'angolo ADC, come fatto nel mezzo cerchio, retto, e perciò uguale ad ABC (§ 61). Onde nel triangolo BCD vi fareb-

rebbero due angoli retti . Il che è impossibile . Sicchè la detta periferia deve passare pel punto B .

PROP. XIII. TEOR. X.

174. *Se una retta CB è tangente del* Fig. 60
cerchio AGD , è dal punto del contatto A
si tira qualunque corda AD ; gli angoli fat-
ti dalla tangente , e dalla corda uguagliano
quelli , che si formano nelle porzioni alter-
ne del cerchio ; cioè l'angolo BAD uguaglia
l'angolo AGD fatto nella porzione AGD ,
e CAD uguaglia l'angolo AFD fatto nella
porzione AFD .

D I M O S T R A Z I O N E .

Pel contatto A si tiri il diametro AE, e si congiunga DE. Essendo l'angolo ADE retto (§ 169), farà la somma di DEA, DAE uguale a un retto (§ 88), e perciò uguale a BAE (§ 150). Sicchè, toltone il comune DAE, farà l'angolo BAD uguale a DEA, e conseguentemente uguale a DGA (§ 168). In oltre del quadrilatero AFDG l'angolo AFD, come supplimento a due retti di AGD (§ 170), è uguale a CAD, ch'è supplimento a due retti di BAD (§ 74). Per la qual cosa se una retta, ec.. Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. XIV. TEOR. XI.

175. *Se la retta AB, esistente fuori del cerchio ADG, incontra la periferia in A, e forma colla corda AD l'angolo BAD uguale all'angolo fatto nella porzione alterna AGED; sarà AB tangente del cerchio in A.*

DIMOSTRAZIONE.

Per A si tirì il diametro AE, e si congiunga DE. Sarà l'angolo ADE retto (§ 169); e conseguentemente la somma de' due DEA, DAE è uguale anche a un retto (§ 88). E perciò, essendo l'angolo BAD = DEA per l'ipotesi, sarà l'angolo BAE retto. Onde BA è tangente in A (§ 153). Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. XV. PROBL. IV.

176. *Data una retta terminata, e data un'angolo rettilineo, costruire una porzione di cerchio, la quale abbia per sua corda la retta data, e gli angoli contenuti in essa uguali all'angolo dato.*

S O L U Z I O N E .

Sia AD la retta data , e sia O il dato angolo .

1. Si faccia nel punto A della retta AD l'angolo DAB uguale all'angolo O (§ 67).

2. Dagli estremi di AD s'innalzino AE , DE rispettivamente perpendicolari ad AB , AD (§ 72), e si prolunghino, finchè s'uniscano in E .

3. Presa AE per diametro , si descriva il cerchio AGD , il quale , essendo l'angolo ADE retto , passa colla periferia pel punto D (§ 173). Dico che $AGED$ è la porzione cercata .

D I M O S T R A Z I O N E .

Essendo AE diametro del cerchio AGD e l'angolo EAB retto ; farà AB tangente nel punto A (§ 153). Dunque gli angoli che si contengono nella porzione AGD , uguagliano l'angolo BAD (§ 174), e conseguentemente l'angolo O . Sicchè s'è costrutta la porzione AGD cercata . Ch'è ciò , che bisognava fare , e dimostrare .

PROP. XVI. PROBL. V.

177. *Dato un cerchio, e dato un'angolo rettilineo, tagliare dal cerchio dato una*
G 2
por-

porzione , che contenghi angoli uguali al dato .

SOLUZIONE.

Sieno AGD il cerchio dato , ed O il dato angolo .

Si tiri prima AB , tangente del cerchio in qualunque punto A ; e poscia si faccia in A l' angolo BAD uguale ad O (§ 67) . Dico essere AGD la porzione cercata .

DIMOSTRAZIONE.

Essendo AB tangente in A ; faranno gli angoli , che si contengono nella porzione AGD , uguali a BAD (§ 174) , e perciò uguali all' angolo O . Sicchè s' è tagliata la porzione AGD cercata . Ch'è ciò , che bisognava fare , e dimostrare .

PROP. XVII. PROB. VI.

178. *Dato qualunque arco di cerchio , dividerlo in due parti uguali .*

SOLUZIONE.

Fig. 61 Sia ACB l' arco dato .

1. Si uniscano gli estremi A , e B dell' arco colla retta AB .
2. Si divida AB in due parti uguali in D (§ 71) ; e dal punto D s' innalzi DG perpendicolare ad AB .

Di-

Dico che l' arco ACB è diviso in C in due parti uguali .

DIMOSTRAZIONE.

Imperciocchè , congiunte le rette AC , CB , gli angoli ADC , BDC sono uguali (§ 61) , e hanno il lato $AD = DB$, e 'l lato DC comune . Dunque è anche la base $AC = BC$ (§ 19) ; e perciò uguali sono pure gli archi AC , CB (§ 164) . Sicchè s' è diviso l' arco ACB in due parti uguali in C . Ch' è ciò , che bisognava fare , e dimostrare .

AVVERTIMENTO I.

179. Si noti che il probl. della divisione dell' arco circolare , e quello della divisione dell' angolo rettilineo non formano in realtà , se non se un' istesso probl. ; poichè sapendosi sciorre l' uno , si sa sciorre anche l' altro . In fatti , preso per centro il vertice dell' angolo AOB , e con qualsivoglia intervallo AO descritto l' arco AB , se si divideFig. 62 l' angolo AOB in qualunque numero di parti uguali colle rette OC , OD , OE , OF , resta diviso ancora l' arco AB nell' istesso numero di parti uguali ; ed al contrario se si divide l' arco AB in qualunque numero di parti uguali AC , CD , DE , EF , FB , nel medesimo numero di parti uguali resta divi-

fo dalle rette OC , OD , OE , OF anche l'angolo AOB.

COROLLARIO.

180. Dunque quelle divisioni in parti uguali , che si possono fare nella Geometria elementare per rispetto degli angoli rettilinei , si possono anche fare per rispetto degli archi circolari ; e tutte le altre sono nella Geometria elementare assolutamente impossibili .

AVVERTIMENTO II.

181. Ancorchè la trisezione degli angoli, e conseguentemente degli archi circolari sia generalmente impossibile nella Geom. elementare : nondimeno la trisezione dell' angolo retto , e perciò dell' arco , che il misura , è possibile . Ed ecco come . Sia ABC un' angolo retto da trisecare . 1. Si prenda in BC ad arbitrio il punto E . 2. Su BE si costruisca il triangolo equilatero BDE (§ 66) . 3. Si divida finalmente l' angolo DBE in due parti uguali colla BG (§ 68) . Sarà l'angolo retto ABC diviso in tre parti uguali ABD , DBG , GBC . Imperciocchè l' angolo DBE è $\frac{1}{3}$ di due retti , o $\frac{2}{3}$ di un retto . Dunque ciascuno degli angoli ABD , DBG , GBC è $\frac{1}{3}$ d' un retto .

AV-

AVVERTIMENTO III.

182. Si noti finalmente che nella Geom. elementare si possono dividere ancora l'angolo retto in 5 parti uguali, e due altri angoli speciali, uno in 3, e l'altro in 5 parti uguali. Però de' modi d'eseguire sì fatte divisioni si dirà a suo luogo.



C A P. V.

Dell'uguaglianza de' rettangoli formati dalle rette, le quali, incontrandosi dentro, o fuori del cerchio, tramezzano tra'l punto dell'incontro, e la periferia.

PROP. XVIII. TEOR. XII.

183. *Se in un cerchio due corde s'intersecano, il rettangolo fatto dalle parti di una è uguale al rettangolo fatto dalle parti dell'altra.*

DIMOSTRAZIONE.

I. Sieno le corde AB, CD ambedue dia- Fig. 64
G 4 me.

metri del cerchio ACBD. Saranno i rettangoli fatti da AO, e OB, e da CO, e OD gli stessi, che i quadrati de' raggi, e conseguentemente uguali (§ 116).

Fig. 65 II. Sia in oltre AB diametro del cerchio ACBD, e intersechi la corda CD, che non è diametro, ad angoli retti. Si congiunga il raggio OD. Essendo delle rette BO, OP la somma AP, e la retta PB la differenza; farà il rettangolo fatto da AP, e PB uguale alla differenza de' quadrati fatti su OB, OP (§ 130), o su OD, OP, e perciò uguale al quadrato di PD (§ 132), e conseguentemente uguale al rettangolo fatto da CP, e PD.

Fig. 66 III. Sia di più AB diametro del cerchio ACBD, ed intersechi la corda CD, che non è diametro, ad angoli obliqui. Dal centro O si cali su CD la perpendicolare OE, e si congiunga il raggio OD. Essendo delle rette BO, OP la somma AP, e la differenza PB, farà il rettangolo fatto da AP, e PB uguale alla differenza de' quadrati fatti su BO, OP (§ 130), o su OD, OP. Similmente essendo delle rette CE, EP la somma DP, e la differenza PC; farà il rettangolo fatto da CP, e PD uguale alla differenza de' quadrati fatti su DE, EP (§ 130), e conseguentemente uguale alla differenza de' quadrati fatti su OD, OP. Dunque il rettangolo fatto da AP, PB è uguale al rettangolo fatto da CP, e PD (§ 51).

IV.

IV. S' intersechino finalmente nel cerchio Fig. 67
ACBD le corde AB, CD, delle quali niuna
sia diametro. Per P si tiri il diametro EF.
Essendo al rettangolo fatto da EP, e PF
uguale sì il rettangolo fatto da AP, e PB,
che il rettangolo fatto da CP, e PD
(*cas. prec.*); farà il rettangolo fatto da
AP, e PB uguale al rettangolo fatto da CP,
e PD (§ 51). Ch' è ciò, che bisognava
dimostrare.

COROLLARIO.

184. Nel caso 2 s' è dimostrato che il Fig. 65
rettangolo fatto da AP, e PB è uguale al
quadrato di PD. Dunque la periferia circo-
lare è una curva d' indole tale, che, calando
da qualunque suo punto la perpendicolare
a qualsivisia diametro, il quadrato della
perpendicolare uguaglia sempre il rettangolo
fatto dalle porzioni, nelle quali dall' istessa
perpendicolare resta diviso il diametro.

AVVERTIMENTO.

185. Si noti che questa proprietà del cer-
chio l' appartiene talmente, che se PD è
perpendicolare ad AB, e 'l quadrato di PD
uguaglia il rettangolo fatto da AP, e PB,
il punto D è alla periferia del cerchio, che
ha per diametro AB. Imperciocchè, divisa
AB

AB in due parti uguali in O, e congiunta OD, essendo il rettangolo fatto da AP, e PB uguale per l'ipotesi al quadrato di PD, aggiuntovi di comune il quadrato di OP; farà il rettangolo fatto da AP, e PB, una col quadrato di OP, uguale alla somma de' quadrati di OP, PD (§ 52), e perciò uguale al quadrato di OD (§ 132). Ma, essendo PA la somma di BO, OP, e BP la differenza, il rettangolo fatto da AP, e PB è uguale alla differenza de' quadrati di OB, OP (§ 130); e conseguentemente il rettangolo fatto da AP, e PB, una col quadrato di OP è uguale al quadrato di OB (§ 52). Sicchè i quadrati di OD, OB sono uguali tra essi (§ 51); e conseguentemente uguali sono le rette OD, OB. Onde la periferia del cerchio, che ha per raggio OB, o per diametro AB passa pel punto D.

PROP. XIX. TEOR. XIII.

Fig. 68 186. *Se da qualunque punto A, esistente fuori di qualsivisia cerchio BCD, si tirano due rette, una, come AB, che sia tangente dell'istesso cerchio, e l'altra che li sia secante, cioè che giunga alla parte concava della periferia, sarà il rettangolo fatto dall'intera secante, e dalla sua parte esistente fuori del cerchio uguale al quadrato della tangente.*

DIMOSTRAZIONE.

I. Sia la secante AC, che passa pel centro O. Si tiri dal centro O al punto del contatto B il raggio OB; farà l'angolo ABO retto (§ 130). Essendo delle rette AO, OD la somma AC, e la differenza AD; farà il rettangolo fatto da CA, e AD uguale alla differenza de' quadrati fatti su OA, OD (§ 130), o su AO; OB, e conseguentemente uguale al quadrato di AB (§ 132).

II. Sia qualunque altra secante AE, che non passa pel centro O. Si cali da O su AE la perpendicolare OG, e si congiunga OF; farà $FG = GE$ (§ 140). Essendo delle rette AG, GF la somma AE, e la differenza AF; farà il rettangolo fatto da EA, ed AF uguale alla differenza de' quadrati di AG, GF (§ 130); e perciò uguale alla differenza de' quadrati di AO, OF, o di AO, OB, e conseguentemente uguale al quadrato di AB (§ 132). Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

COROLLARIO.

187. Quindi tutt' i rettangoli, che si possono formare da tutte le infinite secanti, che dal punto A si possono tirare al cerchio BCD e dalle porzioni di esse esistenti fuori dell'

dell' istesso cerchio , tutti sono tra essi uguali .

PROP. XX. TEOR. XIV.

Fig. 69 188. Sieno da qualunque punto A , esistente fuori di qualsivoglia cerchio BCD , tirate due rette AB , AD , delle quali AB giunga alla parte convessa della periferia , e AD alla parte concava , e sia il rettangolo fatto dalla secante AD , e dalla sua porzione AE , esistente fuori del cerchio , uguale al quadrato di AB ; sarà la retta AB tangente del cerchio nel punto B .


DIMOSTRAZIONE.

Dal punto A si tiri la tangente AC , e dal centro O si tirino le rette OC , OA , OB . Essendo al rettangolo fatto da DA , e AE uguale sì il quadrato di AB per l'ipotesi , che quello di AC (§ 186) ; farà il quadrato di AB uguale al quadrato di AC (§ 51). E perciò farà $AB = AC$ (§ 116). Essendo dunque il lato $AB = AC$ il lato $BO = CO$, e la base AO comune ; farà l'angolo ABO uguale ad ACO (§ 19). Ma ACO è retto (§ 150). Dunque ABO è anche retto ; e perciò AB è tangente nel punto B (§ 153) .. Ch' è ciò , che bisognava dimostrare .

CO.

COROLLARIO.

189. Non potendosi dal punto A tirare alla parte convessa della periferia un' altra retta uguale alle due AB , AC (§ 147); cioè un' altra retta, il cui quadrato sia uguale al rettangolo fatto da DA , e AE . E' manifesto che dal punto A non si può tirare un' altra retta diversa da AB , AC , che sia tangente del cerchio. Sicchè da un punto esistente fuori d' un cerchio non si possono tirare, se non se due tangenti, le quali sono tra esse uguali.



C A P. VI.

Delle Iscrizioni sì delle figure regolari ne' cerchi, che de' cerchi nelle figure regolari, e delle Circoscrizioni tanto delle figure regolari intorno a' cerchi, quanto de' cerchi intorno alle figure regolari.

DEFINIZIONE I.

190. Si dice *figura regolare* ogni rettilineo equilatero, ed equiangolo. Si dice poi *fi-*

figura irregolare ogni rettilineo , a cui mancano o una , o tutte e due le anzidette condizioni .

DEFINIZIONE II.

191. Se una figura regolare è situata in un cerchio in modo , che i vertici de' suoi angoli sòno tutti alla periferia , la figura si dice *iscritta* nel cerchio , e 'l cerchio si dice *circofscritta* intorno la figura . Se poi una figura regolare è situata intorno a un cerchio in modo , che tutt' i suoi lati sono tangenti del cerchio , la figura si dice allora *circofscritta* intorno al cerchio , e 'l cerchio si dice *iscritto* nella figura ,

COROLLARIO I.

192. Dividendo le figure regolari iscritte ne' cerchi le periferie in tante parti uguali , quante ne disegnano i lati di esse : è facile ad intendere che per iscrivere in un cerchio una figura regolare di 3 , 4 , 5 , 6 , ec. lati , è necessario dividere la sua periferia in 3 , 4 , 5 , 6 , ec. parti uguali . E perciò quelle figure regolari si potranno coll' ajuto della Geo. elementare iscrivere ne' cerchi , che esigeranno divisioni della periferia in parti uguali , che si potranno colla riga , e col compasso eseguire . Tutte le altre faranno iscrizioni impossibili nella Geo. elementare ,
ed

DI GEOMETRIA PIANA. 117
ed eseguibili solamente nella Geo. sublime.

COROLLARIO II.

193. In oltre se una figura iscritta in un cerchio è equilatera, è ancora equiangola, e conseguentemente regolare; perchè ogni suo angolo appoggia sull'intera periferia, diminuita di due degli archi uguali, che tagliano i suoi lati.

DEFINIZIONE III.

194. Si dice una retta *adattata* in un cerchio, se è situata nel cerchio in modo, che sia una delle sue corde.

COROLLARIO.

195. Essendo il diametro la massima di tutte le corde del cerchio (§ 148): ne segue che si potrà una retta data adattare in un dato cerchio, se essa non sarà maggiore del suo diametro.

LEMMA.

196. Dato un cerchio, e data una retta, che non sia maggiore del suo diametro, adattare la retta data nel cerchio.

So-

SOLUZIONE.

Fig.70 Sieno ABC il cerchio dato, ed L la data retta.

1. Si tiri nel cerchio qualunque diametro AC . Se farà $AC = L$, farà AC la retta cercata; altrimenti

2. Si tagli $AD = L$ (§ 50); e, descritto col centro A , e coll' intervallo AD l'arco circolare DB (§ 4^a), si congiunga AB . Dico essere AB la retta cercata.

DIMOSTRAZIONE.

Imperciocchè AB è uguale ad AD (§39), e perciò è uguale ad L . Sicchè nel dato cerchio s'è adattata la retta $AB = L$. Ch'è ciò, che bisognava fare, e dimostrare.

PROP. XXI. PROB. VII.

197. *Dato qualunque cerchio, iscrivere in esso il triangolo equilatero.*

SOLUZIONE.

Fig.71 Sia ABC il cerchio dato.

1. Nel cerchio ABC si tiri qualunque diametro BD , e dal punto D s'adattino le rette DA , e DC uguali al raggio (§ prec.).

2. Si congiungano i tre punti A , B , C col-

colle rette AB , BC , CA .

Dico essere ABC il triangolo cercato.

D I M O S T R A Z I O N E .

Si congiungano i raggi OA , OC . Essendo equilatero sì il triangolo AOD , che DOC ; farà sì l'angolo AOD , che DOC un terzo di due retti. Onde ognuno delli tre angoli AOB , BOC , COA farà $\frac{2}{3}$ di due retti. Sicchè gli angoli AOB , BOC , COA sono uguali; e perciò uguali sono anche gli archi AB , BC , CA (§ 159), e conseguentemente uguali le corde AB , BC , CA (§ 164). Onde il triangolo ABC è equilatero. Per la qual cosa nel cerchio ABC s'è iscritto il triangolo equilatero ABC . Ch'è ciò, che bisognava fare, e dimostrare.

C O R O L L A R I O I.

198. Essendo le corde AD , DC uguali, uguali faranno anche gli archi AD , DC (§ 164); onde l'arco AD è $\frac{1}{6}$ della periferia, e conseguentemente la corda AD è lato dell'esagono regolare iscrittibile nel cerchio ABC . Sicchè il lato dell'esagono regolare, iscrittibile in un cerchio, è uguale al raggio dell'istesso cerchio. Quindi s'iscrive l'esagono regolare in un cerchio, adattandovi in

Tom. II.

H

esso

esso intorno intorno il suo raggio.

COROLLARIO II.

199. Se ciascuno degli archi , ne' quali viene la periferia del cerchio divisa dall' esagono regolare iscritto in esso , si divide in due parti uguali , e si congiungono le corde ; si ha il dodecagono regolare iscritto nell' istesso cerchio . Similmente procedendo innanzi s' avranno le figure regolari di 24 , 48 , 96 , ec. lati iscritte nel medesimo cerchio . Sicchè dall' iscrizione nel cerchio del triangolo equilatero ne derivano le iscrizioni nel cerchio di tutte le figure regolari di 6 , 12 , 24 , 48 , 96 , ec. lati .

COROLLARIO III.

200. Finalmente essendo , per l'angolo retto BAD (169) , il quadrato di AB uguale al quadrato del diametro BD , o al quadruplo del quadrato del raggio DO , toltone il quadrato di AD , o di DO (§ 132) ; farà il quadrato del lato del triangolo equilatero iscritto in un cerchio triplo del quadrato del raggio.

PRO.

PROP. XXII. PROBL. VIII.

201. *Dato qualunque cerchio , iscrivere in esso il quadrato .*

S O L U Z I O N E .

Sia ABCD il cerchio dato .

1. Tirato nel cerchio il diametro AC ad Fig. 72
arbitrio , si tiri l' altro BD perpendicolare
ad AC .

2. Si congiungano le rette AB , BC ,
CD , DA .

Dico essere ABCD il quadrato cercato .

D I M O S T R A Z I O N E .

Avendo gli angoli uguali AOB , BOC ,
COD , DOA i lati rispettivamente uguali ,
uguali faranno le basi AB , BC , CD , DA
(§ 19) di essi . Sono di più gli angoli
ABC , BCD , CDA , DAB retti , come fatti
ne' mezzi cerchi (§ 169) . Dunque ABCD
è quadrato (§ 36) . Sicchè nel dato cer-
chio s' è iscritto il quadrato ABCD . Ch' è
ciò , che bisognava fare , e dimostrare .

COROLLARIO I.

202. Se ciascuno de' quattro archi uguali, ne' quali viene divisa la periferia d' un cerchio dal quadrato iscritto in esso, si dividerà in due parti uguali, e si congiungeranno le corde; s' avrà la figura ordinata di 8 lati iscritta nell' istesso cerchio. E se poi coll' istesso metodo si procederà innanzi, s'avranno le figure ordinate di 16, 32, 64, ec. lati iscritte nel medesimo cerchio. Sicchè dalla iscrizione del quadrato nel cerchio ne derivano le iscrizioni nel cerchio delle figure ordinate di 8, 16, 32, 64, ec. lati.

COROLLARIO II.

203. Essendo il quadrato ABCD uguale alla somma de' quadrati fatti su AO, OB (§ 132), e conseguentemente il doppio del quadrato di AO; farà il quadrato iscritto in un cerchio il doppio del quadrato del raggio.

L E M M A .

204. *Costruire un triangolo isoscele, che abbia ciascuno degli angoli alla base il doppio dell' angolo rimanente.*

Sg.

S O L U Z I O N E .

1. Si prenda la retta AB di qualunque Fig. 73
lunghezza , e si divida in C in modo , che
il rettangolo fatto da AB , e BC sia uguale
al quadrato di AC (§ 139).

2. Col centro A , e coll' intervallo AB
si descriva il cerchio BDF (§ 48) ; e ,
adattata in tale cerchio la retta BD = AC
(§ 196) ; si congiunga AD .

Dico essere ABD il triangolo cercato .

D I M O S T R A Z I O N E .

Si congiunga CD , e si descriva un cer-
chio , che colla sua periferia passi per gli
tre punti A , C , D [§ 144] . Essendo
il rettangolo fatto da AB , e BC uguale al
quadrato di AC , e perciò di BD ; sarà BD
tangente del cerchio ACD in D [§ 188] .
Onde sarà l'angolo BDC = DAC [§ 174] ;
e perciò , aggiuntovi di comune CDA ,
sarà l'intero angolo ADB uguale alla
somma di CAD , CDA (§ 52) . Ma
DBC è uguale a BDA (§ 91) ; e DCB
è uguale alla somma di CAD , CDA
[§ 88] . Sicchè l'angolo DBC = DCB
(§ 51) ; e perciò DC = DB (§ 93) ,
e conseguentemente DC = CA . Per la qual
cosa l'angolo CDA = CAD (§ 91) . E'

H 3

an-

anche l'angolo $BDC = CAD$. Sicchè l'intero angolo ADB è il doppio dell'angolo BAD ; e perciò anche ABD è il doppio di BAD . S'è dunque costruito il triangolo isoscele ABD , che ha ciascuno degli angoli alla base BD il doppio dell'angolo rimanente. Ch'è ciò, che bisognava fare, e dimostrare.

COROLLARIO I.

205. Avendo il triangolo BAD ciascuno degli angoli alla base BD il doppio dell'angolo BAD , farà l'angolo BAD $\frac{1}{5}$ di due retti, o $\frac{1}{10}$ di quattro retti; e perciò l'arco BD farà la decima parte della periferia BDF , e conseguentemente la corda BD farà il lato del decagono regolare iscrittibile nel cerchio BDF . Sicchè se il raggio AB di qualunque cerchio BDF si divide in C in modo, che il rettangolo fatto da AB , e BC sia uguale al quadrato di AC , la porzione AC del raggio farà il lato del decagono regolare iscrittibile nell'istesso cerchio; onde se si andrà adattando nel cerchio intorno intorno, s'avrà il decagono regolare iscritto nel cerchio.

COROLLARIO II.

206. Si prolunghi BA in H in modo, che sia il rettangolo fatto da BH, e HA uguale al quadrato di AB. Sarà, tagliata $AC = AH$, il rettangolo fatto da AB, e BC uguale al quadrato di AC (§ 139); onde AC, e conseguentemente AH farà il lato del decagono regolare iscrivibile nel cerchio BDF. Sicchè se il raggio BA di qualunque cerchio BDF si prolunga in H in modo, che il rettangolo fatto da BH, e HA sia uguale al quadrato del raggio AB, la porzione AH sarà pure il lato del decagono regolare iscrivibile nel cerchio BDF.

COROLLARIO III.

207. Sia ABCDEF un mezzo decagono regolare iscritto nel mezzo cerchio ACF. Si congiunga AC; e dal centro O calata OI perpendicolare ad AB, si congiunga BH. Sarà AC un lato del pentagono regolare; e farà, congiunto il raggio OC, l'angolo COI uguale all'angolo COB, una colla metà dell'angolo BOA; e perciò uguale alla metà dell'angolo COF, e conseguentemente uguale all'angolo CAO (§ 165). Onde OC è tangente del cerchio, che colla sua periferia passa per gli tre punti O, H, A

H 4

(§

(§ 175) : e perciò il rettangolo fatto da AC , e CH è uguale al quadrato di OC (§ 186). In oltre, essendo ne' triangoli B^1H , A^1H il lato $B^1I = IA$ (§ 140), il lato IH comune, e l'angolo $B^1IH = A^1IH$ (§ 61), farà l'angolo $HBI = HAI$ (§ 98), e conseguentemente $HBA = BCA$. E perciò AB è tangente del cerchio, che colla sua periferia passa per gli tre punti C , B , H (§ 175). Sicchè il rettangolo fatto da CA , e AH è uguale al quadrato di AB (§ 186). Per la qual cosa la somma de' rettangoli fatti da AC , e CH , e da CA , ed AH , o sia il quadrato di AC (§ 120) è uguale alla somma de' quadrati fatti su OC , AB . Dunque il quadrato fatto sul lato del pentagono regolare iscrivibile in un cerchio è uguale alla somma de' quadrati fatti, uno sul lato del decagono regolare iscrivibile pure nell'istesso cerchio, e l'altro sul raggio.

PROP. XXIII. PROBL. X.

208. *Dato un cerchio, iscrivere in esso il pentagono regolare.*

SOLUZIONE.

Fig. 75 Sia $ACBF$ il cerchio dato.

1. Si tiri qualunque diametro AB , e dal centro O s'innalzi su AB la perpendicolare OC (§ 72).

2. Si

2. Si divida il raggio OB in due parti uguali in D (§ 71); e, congiunta DC , col centro D , e coll' intervallo DC si descriva l' arco circolare CE (§ 48), che interseca AB in E .

3. Finalmente si congiunga CE , e s' adatti nel cerchio intorno intorno (§ 296).

Dico che in tal modo s' avrà il pentagono cercato.

DIMOSTRAZIONE.

Essendo delle rette ED , DO la somma EB , e la differenza EO ; farà il rettangolo fatto da BE , e EO uguale alla differenza de' quadrati di ED , DO (§ 130); o di DC , DO , e perciò uguale al quadrato di OC (§ 132), o di OB . Sicchè EO è il lato del decagono regolare inscritto nel cerchio $ACBF$ (§ 206); e conseguentemente, essendo il quadrato di EC uguale alla somma de' quadrati di EO , OC (§ 132), farà EC il lato del pentagono (§ 207). Per la qual cosa, adattando nel cerchio $ACBF$ intorno intorno la retta CE (§ 196), s' avrà il pentagono cercato. Ch' è ciò, che bisognava dimostrare.

COROLLARIO I.

209. Essendo EO uguale al lato del decagono-

gono regolare iscrivibile nel cerchio ACBF; s'avrà il decagono regolare iscritto nel cerchio ACBF con andarvi in esso adattando intorno intorno la retta EO.

COROLLARIO II.

210. Se ciascuno de' dieci archi uguali, ne' quali verrà divisa la periferia d' un cerchio dal decagono regolare iscritto in esso, si dividerà in due parti uguali, e si congiungeranno le corde; s'avrà la figura regolare iscritta nell' istesso cerchio di 20 lati. Se poi coll' istesso metodo si procederà innanzi, s'avranno le figure regolari di 40, 80, 160, ec. lati iscritte nell' istesso cerchio. Sicchè dall' iscrizione del pentagono regolare nel cerchio ne derivano le iscrizioni nel cerchio delle figure regolari di 10, 20, 40, 80, 160, ec. lati.

AVVERTIMENTO.

211. Si noti che le iscrizioni nel cerchio di tutte le altre figure regolari, dalle già insegnate in fuori, sono tutte impossibili nella Geo. elementare, esigendo operazioni ineseguibili colla riga, e col compasso. E' possibile solamente nella detta Geo. l'iscrizione del quindecagono regolare; e possibili sono conseguentemente le iscrizioni delle figure.

DI GEOMETRIA PIANA: 123
 gure regolari di 30, 60, 120, ec. lati.
 Perciò soggiugniamo la seguente

PROP. XXIV. PROBL. X.

212. *Dato qualunque cerchio, iscrivere in esso il quindecagono regolare.*

S O L U Z I O N E.

Sia ABE il cerchio dato.

1. S'adattino nel cerchio ABE la retta Fig. 76
 AB, che sia il lato del triangolo equilatero
 iscrivibile in esso, e la retta AC, che sia
 il lato del pentagono regolare anche iscrivibile
 in esso (§ 196).

2. Si divida l'arco BC in due parti uguali
 in D (§ 178), e si congiunga BD.

3. Si vada la retta BD adattando intorno
 intorno nel cerchio (§ 196).

S' avrà in tal modo il quindecagono
 cercato.

D I M O S T R A Z I O N E.

Essendo l'arco AB $\frac{2}{3}$, e l'arco AC $\frac{4}{5}$
 della periferia; delle 15 parti uguali, nelle
 quali il quindecagono regolare dee dividere
 la periferia, ne conterrà l'arco AB 5, e l'
 arco AC 3. Onde l'arco BC ne conterrà
 2; e perciò BD farà la 15^{ma} parte della
 pe-

periferia ; e conseguentemente la retta BD farà il lato del quindecagono . Sicchè coll' adattare nel cerchio ACE la retta BD intorno intorno , s' avrà il quindecagono regolare iscritto in esso . Ch' è ciò , che bisognava dimostrare .

COROLLARIO I.

213. Sicchè nella Geometria elementare è divisibile in 3 parti uguali l' arco AC , e in 5 parti uguali l' arco AB .

COROLLARIO II.

214. Se ciascuno de' 15 archi uguali , ne quali verrà divisa la periferia d' un cerchio dal quindecagono regolare iscritto in esso , si dividerà in due parti uguali , e si congiugneranno le corde ; s' avrà la figura regolare iscritta nell' istesso cerchio di 30 lati . Se poi coll' istesso metodo si procederà innanzi , s' avranno le figure regolari di 60 , 120 , 240 , ec. lati iscritte nel medesimo cerchio . Sicchè dall' iscrizione del quindecagono regolare nel cerchio ne derivano le iscrizioni nel cerchio delle figure regolari di 30 , 60 , 120 , 240 , ec. lati .

COROLLARIO III.

215. Sono adunque iscrivibili nel cerchio coll'

coll' ajuto della Geom. elementare solamente le seguenti figure regolari , cioè la figura regolare di 3 lati , e conseguentemente quelle di 6 , 12 , 24 , 48 , ec. lati ; la figura regolare di 4 lati , e conseguentemente quelle di 8 , 16 , 32 , 64 , ec. lati ; la figura regolare di 5 lati , e per conseguenza quelle di 10 , 20 , 40 , 80 , ec. lati ; e la figura regolare di 15 lati , — e conseguentemente quelle di 30 , 60 , 120 , 240 , ec. lati.

AVVERTIMENTO.

216. Si noti che il Renaldini non solamente credè possibili coll' ajuto della Geo. elementare le iscrizioni nel cerchio di tutte le figure regolari ; ma ben anche si lusingò d'aver trovata per tutte le iscrizioni una regola generale . La regola è la seguente . Sia da iscriversi nel cerchio ADB qualunque figura regolare . I. Si tirì qualunque diametro AB , e su di esso si formi il triangolo equilatero ACB (§ 66) . II. Si divida il diametro CD in tante parti uguali , quante ne dinota il numero de' lati della figura da iscrivere ; e da C si tirì per l' estremo della seconda divisione fatta nel diametro la retta CD . III. Si congiunga AD , e si vada nel cerchio adattando intorno intorno (§ 196) . S' avrà in tal modo la
figu-

figura iscritta cercata . Questa regola è vera solo nel caso dell'iscrizione del quadrato, ed in tutti gli altri casi è falsa, come si può vedere nel 5° tomo de' miei elementi di Algebra . Però come l'errore del lato della figura, che si vuole iscrivere, determinato colla regola data, dal lato vero è assai piccolo, qualora si tratta di cerchi piccioli, perciò ne' cerchi piccioli, senza commettere errore sensibile si possono colla regola del Renaldini fare le iscrizioni delle figure regolari.

PROP. XXV. PROBL. XI.

217. *Dato qualunque cerchio, circoscrivere intorno di esso qualsivoglia figura regolare.*

SOLUZIONE.

Sia ACD il cerchio dato.

Fig. 78

1. S' iscriva prima nel cerchio la figura ABCDE regolare dell' istesso numero di lati di quella, che si vuole circoscrivere, s' è possibile, nella Geom. elementare.

2. Per gli vertici di tutti gli angoli in A, B, C, D, E si tirino le tangenti PL, LM, MN, NO, OP (§ 155), che s' uniscono in L, M, N, O, P.

Dico essere LMNOP la figura cercata,
DI

DIMOSTRAZIONE.

Dal centro Q si tirino ai vertici degli angoli della figura iscritta le rette QA , QB , QC , QD , QE , e ai vertici degli angoli della figura circoscritta le rette QL , QM , QN , QO , QP (§ 46). Essendo ne' triangoli LAQ , LBQ il lato $LA = LB$ (§ 189), $AQ = BQ$, e la base LQ comune; farà l'angolo $ALQ = BLQ$, e l'angolo $AQL = BQL$ (§ 99). Sicchè LQ divide in due parti uguali sì l'angolo ALB , che AQB . Similmente si dimostra le rette QM , QN , QO , QP dividere in due parti uguali sì gli angoli BQC , CQD , DQE , EQA , che gli angoli BMC , CND , DOE , EPA . In oltre, per l'uguaglianza degli archi AB , BC , è l'angolo $AQB = BQC$ (§ 159). Onde le metà LQB , MQB di essi sono pure uguali (§ 56). Sono anche gli angoli QBL , QBM uguali, come retti (§ 61). Dunque uguali sono pure gli angoli QLB , QMB (§ 89); e conseguentemente uguali i doppi di essi PLM , LMN . Similmente si dimostra essere l'angolo $LMN = MNO$, $MNO = NOP$, $NOP = OPL$. Dunque la figura $LMNOP$ è equiangola. Finalmente, essendo i triangoli QBL , QBM equiangoli, e avendo di comune il lato QB , farà $LB = BM$ (§ 100). Dell'istef.

stesso modo si dimostra essere $MC = CN$, $ND = DO$, $OE = EP$, $PA = AL$. Ma $LA = LB$. Dunque $LP = LM$ (§ 56). Similmente è $LM = MN$, $MN = NO$, $NO = OP$. Sicchè la figura $LMNOP$ è anche equilatera. Per la qual cosa intorno al dato cerchio s'è circonscritta la figura $LMNOP$, che si desiderava. Ch'è ciò, che bisognava fare, e dimostrare,

COROLLARIO,

218. Sicchè per circonscrivere intorno al cerchio una figura regolare, è necessario prima iscrivere la. Onde si possono nella Geom. elementare circonscrivere intorno a' cerchi solamente quelle figure regolari, le cui iscrizioni ne' cerchi sono possibili coll'ajuto dell'istessa Geom.,

PROP. XXVI. PROBL. XII.

219. *Data qualunque figura regolare, iscrivere dentro di essa il cerchio.*

SOLUZIONE,

Sia $LMNOP$ la figura regolare data,

1. Si dividano in due parti uguali due angoli qualunque PLM , LMN colle rette LQ , MQ (§ 68), le quali, prolungate, s'uniscono in Q ,

2. Da

2. Da Q si calino QA , QB , QC , QD , QE rispettivamente perpendicolari a PL , LM , MN , NO , OP (§ 73).

3. Col centro Q , e coll'intervallo QA , o QB , ec. si descriva il cerchio ACD (§ 48).

Dico che ACD è il cerchio cercato.

DIMOSTRAZIONE.

Si congiungano le rette QP , QO , QN . Essendo ne' triangoli PLQ , MLQ il lato $PL = ML$, il lato LQ comune, e l'angolo $PLQ = MLQ$; sarà l'angolo $LPQ = LMQ$ (§ 98). Ma LMQ è metà di LMN . Dunque LPQ è anche metà di LPO . Similmente si dimostra che QO , e QN dividono in due parti uguali gli angoli PON , ONM . In oltre ne' triangoli LAQ , LBQ l'angolo $LAQ = LBQ$ (§ 61), $ALQ = BLQ$, e 'l lato LQ comune. Onde $AQ = BQ$ (100). Coll'istesso raziocinio si dimostra essere $BQ = CQ$, $CQ = DQ$, $DQ = EQ$. Sicchè tutte le rette AQ , BQ , CQ , DQ , EQ sono tra esse uguali; e perciò il cerchio descritto passa colla sua periferia per tutt' punti A , B , C , D , E , e tocca per conseguenza tutt' i lati della figura in A , B , C , D , E . Per la qual cosa nella data figura s'è iscritto il cerchio ACD . Ch'è ciò, che bisognava fare, e dimostrare.

COROLLARIO

220. Sicchè dividendo due angoli PLM , LMN di qualunque figura regolare $LMNOP$ in due parti uguali colle rette LQ , MQ , che s'uniscono in Q ; le rette tirate da Q ai vertici degli altri angoli della figura dividono quest' altri angoli anche in due parti uguali.

PROP. XXVII. PROBL. XIII.

221. *Data qualunque figura regolare, circoscrivere intorno di essa il cerchio.*

SOLUZIONE.

Sia $ABCDE$ la figura regolare data.

1. Si dividano in due parti uguali due angoli qualunque ABG , BCD colle rette BQ , CQ (68), le quali prolungate s'uniscono in Q .

2. Col centro Q , e coll'intervallo QB , o QC si descriva il cerchio ACD (§ 48).

Dico che ACD è il cerchio cercato.

DIMOSTRAZIONE.

Si congiungano le rette QD , QE , QA .
Dividendo QB , QC gli angoli in B , e C della figura in due parti uguali, anche QD ,
 QE ,

QE, QA divideranno in due parti uguali gli angoli in D, E, A della figura (§ prec.). Sicchè gli angoli QAB, QBA sono tra essi uguali, e conseguentemente $AQ = QB$ (§ 93). Similmente si dimostra essere $QB = CQ$, $CQ = DQ$, $DQ = EQ$. Onde tutte le rette QA, QB, QC, QD, QE sono tra esse uguali; e perciò il cerchio descritto passa colla sua periferia per gli vertici di tutti gli angoli in A, B, C, D E della figura. Per la qual cosa intorno la data figura s'è circoscritto il cerchio ACD. Ch'è ciò, che bisognava fare, e dimostrare.

COROLLARIO.

222. Per iscrivere dunque, e circoscrivere il cerchio intorno a qualunque figura regolare, d'altro non v'è bisogno, se non se della divisione di due angoli della figura in due parti uguali. Onde colla riga, e col compasso si può iscrivere, e circoscrivere il cerchio intorno a qualunque figura regolare.

PROP. XXVIII. PROBL. XIV.

223. *Dato il solo raggio d'un cerchio; determinare i lati delle figure regolari di 3, 4, 5, 6, e 10 lati, iscrivibili coll'ajuto della Geo. elementare nell'istesso cerchio.*

SOLUZIONE.

Fig. 79 Sia AB il raggio dato.

1. Dal punto B s'innalzi BC perpendicolare (§ 72), ed uguale ad AB (§ 50); e si congiunga AC .

2. Dal punto C s'innalzi CD perpendicolare ad AC , ed uguale ad AB ; e si congiunga AD .

3. Si divida AB in E in modo, che 'l rettangolo fatto da BA , ed AE sia uguale al quadrato di BE (§ 139), o si prolunghi AB in F in modo, che 'l rettangolo fatto da AF , ed FB sia uguale al quadrato di AB (§ 138); e si congiungano CE , CF .

Dico essere AB il lato dell' esagono, AC del quadrato, AD del triangolo, BE , o BF del decagono, e CE , o CF del pentagono,

DIMOSTRAZIONE.

Essendo AB il raggio, farà AB il lato dell' esagono (§ 198). In oltre, essendo il quadrato di AC uguale alla somma de' quadrati fatti su AB , BC (§ 132), e perciò doppio del quadrato del raggio AB ; farà AC lato del quadrato (§ 203). Di più, essendo il quadrato di AD uguale alla somma de' quadrati fatti su AC , CD (§ 132), e perciò triplo del quadrato del raggio AB ;


AB; farà AD lato del triangolo equilatero (§ 200). Essendo di vantaggio il rettangolo fatto da BA, ed AE uguale al quadrato di BE, o 'l rettangolo fatto da AF, ed FB uguale al quadrato di AB; farà BE (§ 205), o BF (§ 206) lato del decagono. Finalmente, essendo il quadrato di CE, o di CF uguale alla somma de' quadrati fatti fatti su EB, BC, o su FB, BC (§ 132); farà EC, o CF lato del pentagono (§ 207). Ch' è quanto bisognava dimostrare.

AVVERTIMENTO.

224. Per quanto s' è fin qui dimostrato; è facile a calcolare i lati delle dette figure regolari relativamente al raggio di qualunque cerchio. Sia per esempio il raggio OC Fig. 79 di 100 palmi. Sarà il quadrato iscritto nell' istesso cerchio di 20000 palmi quadrati; onde il suo lato farà di palmi 141. 4, radice di 20000. Sarà in oltre il quadrato del lato del triangolo equilatero di 30000 palmi quadrati; onde il lato farà di pal. 173. 2, radice di 30000. Di più, essendo $OD = 50$, e $OC = 100$, farà il quadrato di $DC = 12500$; onde la sua radice 111. 3 dà DC; o sia DE; e perciò EO, o sia il lato del decagono = 61. 3. Finalmente, essendo $OC = 100$, ed $EO = 61. 3$; farà il quadrato di $EC = 13757. 69$; onde la sua radice 117. 2 dà il lato del pentagono: Sicchè,

posto il raggio = 100, sono il lato del triangolo = 173. 2, il lato del quadrato = 141. 4, il lato del pentagono = 117. 2, il lato dell' esagono = 100, e 'l lato del decagono = 61. 3.

Fine del secondo Libro.



LIBRO III.

Della dottrina della Ragione,
e Proporzione geometrica.DEFINIZIONI , E NOZIONI
PRELIMINARI.

DEFINIZIONE I.

225. Due grandezze si dicono *omogenee* ; se sono uguali , o possono divenirle coll' accrescere l'una , o col diminuire l' altra ; si dicono poi *eterogenee* , se non hanno uguaglianza , nè possono acquistarla , qualunque accrescimento si dia all' una ; o diminuzione all' altra .

Così grandezze *omogenee* sono e tutte le linee tra esse , e tutte le superficie tra esse , e tutt' i solidi tra essi , e tutt' i moti tra essi , e tutte le velocità de' corpi tra esse , e tutte le forze de' corpi tra esse , ec. :

sono poi eterogenee una linea, e un solido; una superficie, e un moto, ec.,

DEFINIZIONE II.

226. Se due grandezze omogenee sono disuguali, si dicono la minore *parte* della maggiore, e la maggiore *moltiplice* della minore. E se la minore misura esattamente la maggiore, si dicono la minore *parte aliquota* della maggiore, e la maggiore *moltiplice aliquota* della minore. Se poi la minore non misura con esattezza la maggiore; si chiamano allora la minore *parte aliquanta* della maggiore, e la maggiore *moltiplice aliquanto* della minore.

Così del 15 il 3 è parte aliquota, e'l 4 parte aliquanta; e del 3 il 15 è moltiplice aliquota, e'l 16 moltiplice aliquanto.

DEFINIZIONE III.

227. Se una grandezza minore misura esattamente più grandezze maggiori, si dice la minore *parte aliquota comune* di tutte le maggiori. Se poi una grandezza maggiore viene esattamente misurata da più grandezze minori, la maggiore si dice *moltiplice aliquota comune* di tutte le minori.

Così il 2 è parte aliquota comune di 4, 6, 8, 10; e'l 12 è moltiplice aliquota comune di 2, 3, 4, 6.

AVVERTIMENTO I.

228. Si noti che due grandezze omogenee possono avere un' aliquota comune finita , cioè che le misura un numero finito di volte , e possono non averne alcuna ; perchè si può dare il caso che la decima , o centesima , o millesima , o altra parte finita dell' una sia misura esatta dell' altra ; e si può anche dare il caso che non sia misura esatta dell' una nè la decima , nè la centesima , nè la millesima , nè altra parte finita dell' altra . Nel primo caso le grandezze si dicono *grandezze commensurabili* , e nell' altro *grandezze incommensurabili* . Però ancorchè due grandezze incommensurabili non abbiano un' aliquota comune finita : nondimeno possiamo sempre idearci di esse un' aliquota comune infinitamente picciola . Imperciocchè una parte aliquota infinitamente picciola di una deve essere anche parte aliquota dell' altra , o parte aliquota d' una grandezza , che si potrà prendere per l' altra senza errore sensibile .

AVVERTIMENTO II.

229. Si noti pure che di qualunque numero di grandezze omogenee vi dee sempre essere , o possiamo sempre idearci un' aliquota comune . Contrassegnino A , B , C ,
D ,

D, E, ec. più grandezze omogenee . Avendo sempre due grandezze omogenee , o potendoci sempre di due grandezze omogenee almeno ideare un' aliquota comune ; se contrassegneremo con L l' aliquota comune di A , e B , con M l' aliquota comune di L , e C , con N l' aliquota comune di M , e D , con O l' aliquota comune di N , ed E , ec. ; faranno delle grandezze A , B , C l' aliquota comune M , delle grandezze A , B , C , D l' aliquota comune N , delle grandezze A , B , C , D , E l' aliquota comune O , ec. .

DEFINIZIONE IV.

230. Se due ; o più grandezze minori misurano esattamente , ed ugual numero di volte altrettante grandezze maggiori , si dicono le minori *parti aliquote simili* delle maggiori , e le maggiori *moltiplici simili* , o *ugualmente moltiplici* delle minori .

Così 2 , 3 , 4 sono parti aliquote simili di 8 , 12 , 16 ; 8 , 12 , 16 sono moltiplici simili di 2 , 3 , 4 .

COROLLARIO.

231. Quindi due , o più grandezze , omogenee , o eterogenee che sieno , possono avere infinite diverse aliquote simili ; perchè possono avere infinite parti come le metà di esse , le terze parti , le quarte parti , e
co-

così procedendo all' infinito , che le misurino esattamente , ed ugual numero di volte .

DEFINIZIONE V.

232. *Ragione* si dice il paragone di due grandezze omogenee , fatto circa la quantità di esse . Le grandezze si dicono *termini* della ragione ; e con ispezialità quella , che si paragona , si dice *antecedente* , e l' altra , con cui si fa il paragone , si chiama *conseguente* .

AVVERTIMENTO

233. Si possono due grandezze omogenee paragonare circa la quantità di esse , o osservando quante volte l' una contiene l' altra , o osservando di quanto l' una eccede l' altra . Quindi è derivata la distinzione della ragione in *ragione geometrica* , e in *ragione aritmetica* .

DEFINIZIONE VI.

234. La ragione si dice *geometrica* , se le grandezze si paragonano osservando quante volte l' antecedente contiene il conseguente , si dice poi *aritmetica* , se il paragone si fa osservando di quanto l' antecedente eccede il conseguente .

AV.

AVVERTIMENTO.

235. Si noti che se A , e B contrassegnano due grandezze omogenee, la ragione di esse si noterà o scrivendo: *ragione di A a B* , o scrivendo: *ragione di $A : B$* ; e si profferirà sempre dicendo: *ragione di A a B* . Si noti altresì che tratteremo qui della sola ragione geometrica, avendo essa sola luogo nella Geo. elementare; onde col vocabolo ragione intenderemo appresso sempre la ragione geometrica.

DEFINIZIONE VII.

236. Si chiama *quantità*, *esponente*, o *denominatore* della ragione il numero, che dinota quante volte l'antecedente contiene il conseguente.

COROLLARIO I.

237. Consistendo la ragione nel paragone di due grandezze omogenee, fatto con osservare quante volte l'antecedente contiene il conseguente; allora si conoscerà, e si determinerà la vera ragione di due grandezze, quando si conoscerà con esattezza quante volte l'antecedente conterrà il conseguente.

AV.

A V V E R T I M E N T O I.

238. Si noti che si può conoscere quante volte una grandezza contiene un'altra, e conseguentemente si può conoscere, e determinare la vera ragione di due grandezze, se o una è aliquota finita dell'altra, o ambedue hanno un aliquota comune finita; cioè se le grandezze sono commensurabili. In fatti se di due grandezze omogenee una misura l'altra con esattezza 5 volte, si conosce allora avere la maggiore alla minore la ragione di 5 : 1, e la minore alla maggiore la ragione di 1 : 5; e in tal caso la quantità della prima ragione è 5, e quella della seconda è $\frac{1}{5}$. E se due altre grandezze hanno un'aliquota comune, la quale misura la maggiore 11 volte, e la minore 7 volte; si conosce pure avere la maggiore alla minore la ragione di 11 : 7, e la minore alla maggiore la ragione di 7 : 11; e in tale altro caso la quantità della prima ragione è $\frac{11}{7}$, e quella della seconda è $\frac{7}{11}$. L'istesso non è delle grandezze incommensurabili; perchè di queste, benchè si possa sempre immaginare un'aliquota comune infinitamente picciola, non potendosi però esprimere l'infinito numero delle parti dell'una, e l'infinito numero delle parti dell'altra, che uguagliano l'aliquota comune di esse, non si potrà mai nè conoscere, nè de-

determinare la vera ragione .

COROLLARIO II.

239. Dunque la vera ragione di due grandezze omogenee si può conoscere , e determinare , se le grandezze sono commensurabili , e non già se sono incommensurabili .

AVVERTIMENTO II.

240. Si noti intanto che sebbene di due grandezze incommensurabili , che per chiarezza chiamo A e B , non se ne possa sapere la vera ragione ; si può però conoscerne una ragione prossima alla vera a questo modo si prenda una parte aliquota finita di A , che sia la più piccola che si possa comodamente prendere , e s' esplori quante volte misura l' altra B . Sebbene la detta parte non possa esattamente misurare B , misura però esattamente una grandezza , che si può prendere per la grandezza B senza errore affai sensibile . Or se la detta parte è la 10000^{ma} di A , e misura 14723 volte la grandezza B ; si dirà avere la grandezza A alla grandezza B a un di presso la ragione di 10000 : 14723 .

DE-

DEFINIZIONE VIII.

241. La ragione di due grandezze si dice *razionale*, se essa si può con esattezza determinare; si dice poi *irrazionale*, se si può determinare solamente a un di presso.

COROLLARIO.

242. Sicchè la ragione delle grandezze commensurabili è razionale, e quella delle incommensurabili è irrazionale.

DEFINIZIONE IX.

243. Si dicono *ragioni uguali* quelle, che hanno quantità uguali. Si dicono poi *ragioni disuguali* quelle, che hanno quantità disuguali; e specialmente si dice *ragione maggiore* quella, la cui quantità è maggiore.

COROLLARIO I.

244. Sicchè quando due ragioni sono uguali, gli antecedenti sono ambidue maggiori, uguali, o minori rispettivamente de' conseguenti.

COROLLARIO II.

245. Se le quantità di due ragioni sono uguali alla quantità d'una terza ragione, tali quantità sono anche uguali tra esse (§51); e se le quantità di due ragioni sono uguali tra esse, e la quantità d'una di esse è maggiore, o minore della quantità d'una terza ragione, farà la quantità dell'altra ragione maggiore, o minore ancora della quantità della terza (§51). Dunque se due ragioni sono uguali a una terza, sono anche uguali tra esse; e se due ragioni sono uguali tra esse, ed una di esse è maggiore, o minore d'una terza, l'altra è anche maggiore, o minore dell'istessa terza.

DEFINIZIONE X.

246. Una ragione si dice *semplice*, s'è il paragone di due sole grandezze; si dice poi *composta*, se la sua quantità è il prodotto delle quantità di più ragioni semplici.

Così se saranno le ragioni semplici di 2: 1, di 6: 2, di 12: 3, perchè le quantità di esse sono 2, 3, 4, e 'l prodotto di tali quantità è 24; si dirà ogni ragione, che ha per quantità il 24, come la ragione di 24: 1, quella di 48: 2, quella di 72: 3, ec. composta dalle ragioni di 2: 1, di 6: 2, di 12: 3.

DE.

DEFINIZIONE XI.

247. Una ragione composta da più ragioni uguali si dice *duplicata*, *triplicata*, *quadruplicata*, ec. di ciascuna delle ragioni componenti, secondoche il numero delle componenti è 2, 3, 4, ec.

DEFINIZIONE XII.

248. La ragione del conseguente all' antecedente in ogni ragione si dice *reciproca* di quella dell' antecedente al conseguente.

Così della ragione di $A : B$ la reciproca è quella di $B : A$.

DEFINIZIONE XIII.

249. Se si considera la ragione di $A : B$ relativamente a quella di $C : D$, si dirà la ragione di $A : B$ essere *diretta* della ragione di $C : D$, se quella di $A : B$ sarà uguale alla ragione di $C : D$; si dirà poi la ragione di $A : B$ essere *reciproca* della ragione di $C : D$, se la ragione di $A : B$ farà uguale alla ragione $D : C$.

DEFINIZIONE XIV.

250. Si dice *proporzione geometrica* l'uguaglianza di due ragioni geometriche.

Tom. II.

K

AV.

AVVERTIMENTO.

251. Si noti che tra le due ragioni uguali d' ogni proporzione geometrica s' intramette il segno dell' uguaglianza ($=$). Onde si scrive la proporzione geometrica a questo modo $A : B = C : D$, e si profferisce dicendo A sta al B, come il C al D.

COROLLARIO I.

252. Essendo la proporzione formata da due ragioni uguali, faranno il primo, e l' terzo termine ambidue o maggiori, o uguali, o minori rispettivamente degli altri due.

COROLLARIO II.

253. Potendo essere due ragioni geometriche uguali tra esse, ancorchè le grandezze dell' una sieno eterogenee colle grandezze dell' altra: ne segue che nella proporzione geometrica possono essere le grandezze d' una ragione omogenee colle grandezze dell' altra, e possono anch' essere eterogenee.

DEFINIZIONE XV.

254. La proporzione geometrica si dice *discreta*, se viene composta da quattro grandezze tra esse diverse; si dice poi *continua*, se

se viene composta da tre, e quella di mezzo è conseguente nella prima ragione, e antecedente nella seconda.


Così $A : B = C : D$ si dice *proporzione discreta*, e continua $A : B = B : C$.

DEFINIZIONE XVI.

255. Le grandezze, che formano la proporzione, si dicono *grandezze proporzionali*: quella di mezzo nella proporzione continua si dice la *mezza proporzionale*: i due antecedenti si dicono tra essi *grandezze omologhe*, e i due conseguenti si dicono pure tra essi *grandezze omologhe*.

AVVERTIMENTO.

256. Si noti che, risguardando la dottrina delle ragioni, e proporzioni tutte le spezie di grandezze, le linee, di cui faremo uso in sì fatta dottrina, faranno le veci di caratteri generali; onde contrassegneremo con esse non le sole lunghezze, ma grandezze d'ogni sorta.



C A P. I.

De' caratteri da conoscere l'uguaglianza, e la disuguaglianza delle ragioni; e dell'uso di tali caratteri in determinare di quali grandezze le ragioni sono uguali, e di quali sono disuguali.

PROP. I. TEOR. I.

257. Due ragioni sono uguali, se le aliquote simili de' conseguenti sono aliquote simili pure degli antecedenti.

DIMOSTRAZIONE.

Fig. 80 Sieno nelle due ragioni di $A : B$, e di $C : D$ le grandezze L , ed M aliquote simili sì de' conseguenti B , e D , che degli antecedenti A , e C . E poichè la ragione di $A : B$ è l'istessa di quella del numero delle parti di A , che uguagliano L , al numero delle parti di B , che pure uguagliano L ; e la ragione di $C : D$ è l'istessa di quella del numero delle parti di C , che ugualiano M , al numero delle parti di D ,
che

che pure uguagliano M . Dunque essendo gli stessi i numeri delle parti di A , e C , che uguagliano rispettivamente L , ed M , e gli stessi i numeri delle parti di B , e D , che pure uguagliano rispettivamente L , e M ; la quantità della ragione di $A : B$ farà l'istessa della quantità della ragione di $C : D$. E perciò la ragione di $A : B$ è uguale alla ragione di $C : D$ (§ 243). Ch'è ciò che bisognava dimostrare.

PROP. II. TEOR. II.

258. *Se L , ed M sono aliquote simili de' conseguenti B , e D , e non già degli antecedenti A , e C , ed L misura più volte A di quello M misura il C ; sarà la ragione di $A : B$ maggiore della ragione di $C : D$.*

DIMOSTRAZIONE.

Imperciocchè la ragione di $A : B$ è l'istessa di quella del numero delle parti di A , che uguagliano L , al numero delle parti di B , che pure uguagliano L . Similmente la ragione di $C : D$ è l'istessa di quella del numero delle parti di C , che uguagliano M , al numero delle parti di D , che uguagliano anche M . Ma, ancorchè i numeri delle parti di B , e D ; che uguagliano rispettivamente L , ed M sieno gli stessi, il numero però delle parti di A , che ugua-

gliano L , è maggiore del numero delle parti di C , che uguagliano M . Dunque la quantità della ragione di $A : B$ è maggiore della quantità della ragione di $C : D$. E perciò la ragione di $A : B$ è maggiore della ragione di $C : D$ (§ 243). Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. III. TEOR. III.

259. *Sia la ragione di $A : B$ uguale alla ragione di $C : D$. Dico che tra le infinite diverse aliquote simili, che possono avere i conseguenti, ve ne debbono essere di quelle, che si possono prendere per aliquote degli antecedenti, e tali aliquote si debbono prendere ancora per aliquote simili de' medesimi antecedenti.*

DIMOSTRAZIONE.

Potendo avere B , e D infinite diverse aliquote simili (§ 231), possono avere anche delle aliquote simili infinitamente picciole. Dunque B , e D possono avere aliquote simili, che si possono prendere per aliquote di A ; e C (§ 228). Si concepisca che L , ed M sieno sì fatte aliquote. Se L , ed M non sono aliquote simili di A , e C , la ragione di $A : B$ non è uguale a quella di $C : D$ (§ 258). Ma ciò ripugna all'ipotesi. Dunque L , ed M , che si possono prendere per aliquote di A , e C , si debbono prendere an-

anche per aliquote simili di A , e C . Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. IV. TEOR. IV.

260. *Sia la ragione di $A : B$ maggiore di quella di $C : D$. Dico che tra le infinite diverse aliquote simili, che possono avere i conseguenti B , e D , ve ne debbono essere di quelle, che si possono prendere per aliquote di A , e C , e sì fatte aliquote debbono essere tali, che l'una dee misurare più volte A di quello l'altra misura il C .*

DIMOSTRAZIONE.

Potendo avere B , e D infinite diverse aliquote simili (§ 231), possono avere anche delle aliquote simili infinitamente piccole. Dunque B , e D possono avere aliquote simili, che si possono prendere per aliquote di A , e C (§ 228). Si concepisca che L , e M sieno sì fatte aliquote. Se L non misura più volte A di quello M misura il C , misurerà L l'istesso, o minor numero di volte A di quello M misura il C . Onde la ragione di $A : B$ è o uguale alla ragione di $C : D$ (§ 257), o minore dell'istessa ragione di $C : D$ (§ 258). Ma ambedue tali cose ripugnano all'ipotesi. Dunque L dee misurare più volte A di quello M misura il C . Sicchè delle grandezze L ,

ed M , che si possono prendere per aliquote di A , e C , più volte L misura A di quello M misura il C . Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

AVVERTIMENTO.

261. Posti i caratteri da conoscere l'uguaglianza, e la disuguaglianza di due ragioni, e poste le converse di tali caratteri; procediamo ora a vedere di quali grandezze le ragioni sono uguali, e di quali sono disuguali.

PROP. V. TEOR. V.

262. *Se due grandezze uguali si paragonano con una terza omogenea, le due grandezze hanno ragioni uguali alla terza, e la terza ha ragioni uguali alle due grandezze.*

DIMOSTRAZIONE.

Fig. 81 Sieno A , e B le due grandezze uguali, e C sia la terza omogenea. S'intenda essere L aliquota comune di A , e C . Essendo $A = B$, misurerà L tante volte A , quante volte misura B . Onde L , e L sono aliquote simili sì di A , e B , che di C , e C . È perciò la ragione di $A : C$ è uguale alla ragione di $B : C$, e la ragione di $C : A$ è uguale a quella di $C : B$ (§ 257). Ch'è
ciò

ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. VI. TEOR. VI.

263. *Se due grandezze disuguali si paragonano con una terza omogenea, la ragione della grandezza maggiore alla terza è maggiore della ragione della minore all' istessa terza; e all' opposto la ragione della terza alla minore è maggiore della ragione dell' istessa terza alla maggiore.*

DIMOSTRAZIONE.

Sieno A, e B due grandezze disuguali, Fig. 82 ed A sia maggiore di B, e C sia la terza omogenea.

I. S' intenda essere L aliquota comune di A, B, C. Essendo A maggiore di B, misurerà L più volte A, che B. Dunque L, ed L sono aliquote simili di C, e C, e non già di A, e B; e, misurando L più volte A, che B, farà la ragione di A : C maggiore della ragione di B : C (§ 258).

II. S' intendano essere L, e M aliquote simili di A, e B, ed aliquote di C. Essendo A maggiore di B, farà L maggiore anche di M. Onde M misurerà più volte C di quello L misura l' istessa C. Dunque M, ed L sono aliquote simili di B, ed A, e non già di C, e C; e, misurando M più volte C di quello L misura l' istessa C, farà la

ragione di $C : B$ maggiore della ragione di $C : A$ (§ 258). Ch' è quanto bisognava dimostrare.

PROP. VII. TEOR. VII.

264. *Le grandezze , che hanno uguali ragioni a una terza , sono uguali tra esse ; e le grandezze , alle quali una terza ha uguali ragioni , sono tra esse anche uguali .*

DIMOSTRAZIONE.

Fig. 81 I. Sia la ragione di $A : C$ uguale alla ragione di $B : C$. Se non è $A = B$, farà A maggiore, o minore di B . Dunque la ragione di $A : C$ è maggiore, o minore di quella di $B : C$ (§ 263). Ma ciò ripugna all' ipotesi. Dunque ripugna non essere $A = B$; e perciò $A = B$.

II. Sia la ragione di $C : A$ uguale alla ragione di $C : B$. Se non è $A = B$, farà A maggiore, o minore di B . Dunque la ragione di $C : A$ è minore, o maggiore di quella di $C : B$ (§ 263). Ma ciò ripugna all' ipotesi. Sicchè ripugna non essere $A = B$; e perciò è $A = B$. Ch' è quanto bisognava dimostrare.

PROP.


PROP. VIII. TEOR. VIII.

265. *Sia la ragione di $A : C$ maggiore della ragione di $B : C$. Dico che A è maggiore di B . Sia in oltre la ragione di $C : B$ maggiore di quella di $C : A$. Dico pure che A è maggiore di B .* Fig. 82

D I M O S T R A Z I O N E .

I. Se si nega essere A maggiore di B , farà A uguale, o minore di B . Dunque la ragione di $A : C$ è uguale (§ 262), o minore della ragione di $B : C$ (§ 263). Ma ciò ripugna all' ipotesi. Dunque ripugna non essere A maggiore di B ; e perciò è A maggiore di B .

II. Se si nega pure essere A maggiore di B , farà A uguale, o minore di B . Dunque la ragione di $C : B$ è uguale alla ragione di $C : A$ (§ 262), o minore della ragione di $C : A$ (§ 263). Ma anche ciò ripugna all' ipotesi. Sicchè ripugna non essere A maggiore di B ; e perciò è A maggiore di B . Ch' è quanto bisognava dimostrare.



C A P. II.

Della dottrina della Ragione composta.

PROP. IX. TEOR. IX.

Fig. 83 266. *Sieno le ragioni di $A : B$, di $C : D$, di $E : F$, ec. rispettivamente maggiori, uguali, o minori delle ragioni di $L : M$, di $N : O$, di $P : Q$, ec.. Dico essere la ragione composta dalle prime maggiore, uguale, o minore della ragione composta dalle seconde.*

D I M O S T R A Z I O N E.

Essendo le ragioni di $A : B$, di $C : D$, di $E : F$ rispettivamente maggiori, uguali, o minori delle ragioni di $L : M$, di $N : O$, di $P : Q$, i numeri, ch' esprimeranno le quantità delle prime saranno maggiori, uguali, o minori rispettivamente de' numeri, ch' esprimeranno le quantità delle seconde. Onde il prodotto delle quantità delle prime ragioni sarà maggiore, uguale, o minore del prodotto delle quantità delle ragioni seconde. E perciò la composta dalle ragioni di $A : B$, di $C : D$, di $E : F$ farà maggiore, uguale, o minore della composta dalle ragioni di $L : M$, di $N : O$,
di

di $P : Q$ (§ 243). Ch' è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. X. TEOR. X.

167. Sieno A, B, C tre grandezze omogenee qualunque. Dico essere la ragione di $A : C$ composta dalle ragioni di $A : B$, e di $B : C$.

DIMOSTRAZIONE.

Rappresentino L, M, N i numeri esponenti le grandezze A, B, C relativamente a una aliquota comune di esse; esprimeranno il rotto $\frac{L}{M}$ la quantità della ragione di

$A : B$, e 'l rotto $\frac{M}{N}$ la quantità della ragione di $B : C$. Onde il prodotto $\frac{L}{M} \times \frac{M}{N}$ esprimerà la quantità della composta dalle ragioni di $A : B$, e di $B : C$ (§ 246).

Ma sì fatto prodotto è uguale al rotto $\frac{L}{N}$, ovvero alla quantità della ragione di $A : C$. Dunque la ragione di $A : C$ è composta dalle ragioni di $A : B$, e di $B : C$ (§ 246). Ch' è ciò, che bisognava dimostrare.

CO.

COROLLARIO I.

268. Sieno A, B, C, D, E , ec. grandezze tutte omogenee. Essendo la ragione di $A : E$ composta dalle ragioni di $A : D$, e di $D : E$, quella di $A : D$ composta dalle ragioni di $A : C$, e di $C : D$, e quella di $A : C$ composta dalle ragioni di $A : B$, e di $B : C$; farà la ragione di $A : E$ composta da tutte le ragioni di $A : B$, di $B : C$, di $C : D$, e di $D : E$. Sicchè se tra due grandezze omogenee se ne intramettono quante altre se ne vogliono, e di qualunque grandezza, la ragione della prima all'ultima è sempre composta da tutte le ragioni della prima alla seconda, della seconda alla terza, della terza alla quarta, e così procedendo fino all'ultima.

COROLLARIO II.

269. Quindi se A, B, C, D, E , ec. faranno continuamente proporzionali, la ragione della prima A alla terza C farà composta dalle due ragioni uguali di $A : B$, e di $B : C$, e perciò farà duplicata d'una di esse; la ragione della prima A alla quarta D farà composta dalle tre ragioni uguali di $A : B$, di $B : C$, e di $C : D$, e perciò farà triplicata di ciascuna di esse; la ragione della prima A alla quinta E farà com-
po-

posta dalle quattro ragioni uguali di $A : B$, di $B : C$, di $C : D$, e di $D : E$, e perciò farà quadruplicata di ciascuna di esse (§ 147); e così procedendo all'infinito.

PROP. XI. TEOR. XI.

270. *Se la ragione di $A : B$ è maggiore, uguale, o minore della ragione di $L : M$, la duplicata, la triplicata, la quadruplicata, ec. di quella sono anche maggiori, uguali, o minori rispettivamente della duplicata, della triplicata, della quadruplicata, ec. di questa.*

DIMOSTRAZIONE.

Essendo la ragione di $A : B$ maggiore, uguale, o minore della ragione di $L : M$; faranno le componenti della duplicata, della triplicata, della quadruplicata, ec. di quella di $A : B$ maggiori, uguali, o minori delle componenti della duplicata, della triplicata, della quadruplicata, ec. della ragione di $L : M$. Dunque la duplicata, la triplicata, la quadruplicata, ec. della ragione di $A : B$ sono anche rispettivamente maggiori, uguali, o minori della duplicata, della triplicata, della quadruplicata, ec. della ragione di $L : M$ (§ 266). Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP.

PROP. XII. TEOR. XII.

271. *Se le duplicate , triplicate , quadruplicate , ec. delle ragioni di $A : B$, e di $L : M$ sono rispettivamente uguali , anche le ragioni di $A : B$, e di $L : M$ sono tra esse uguali .*

DIMOSTRAZIONE.

Se si nega essere la ragione di $A : B$ uguale a quella di $L : M$; sarà la ragione di $A : B$ maggiore , o minore della ragione di $L : M$. Dunque la duplicata , la triplicata , la quadruplicata , ec. della ragione di $A : B$ faranno maggiori , o minori rispettivamente della duplicata , della triplicata , della quadruplicata , ec. di quella di $L : M$ (§ *prec.*) . Ma ciò ripugna all' ipotesi . Dunque ripugna non essere le ragioni di $A : B$, e di $L : M$ uguali tra esse . Sicchè le ragioni di $A : B$ e di $L : M$ sono uguali . Ch'è ciò , che bisognava dimostrare .



C A P. III.

Delle principali trasformazioni , che si possono fare nelle due ragioni di qualsiviasa proporzione geometrica , senza togliere la proporzione .

DEFINIZIONE.

272. Si dice che una ragione *s' inverte* , quando si paragona il suo conseguente coll' antecedente : che si *compone* , quando si paragona la somma dell' antecedente , e conseguente coll' istesso conseguente : che si *divide* , quando si paragona l' eccello dell' antecedente sul conseguente coll' istesso conseguente : e finalmente che si *converte* , quando si paragona l' antecedente coll' eccello dell' antecedente sul conseguente .

Così della ragione di $A : B$ s' avranno , invertendo , la ragione di $B : A$, componendo , la ragione di $A + B : B$, dividendo , la ragione dell' eccello di A sul B al B , convertendo , la ragione di A all' eccello di A sul B ,

PROP. XIII. TEOR. XIII.

273. Se quattro grandezze sono proporzionali,
Tom.II. L ali,

nali , invertendo le due ragioni , si hanno grandezze anche proporzionali .

DIMOSTRAZIONE.

Fig.80 Sia $A : B = C : D$. S' intenda che L , ed M sieno le aliquote simili di B , e D , che si possono prendere per aliquote simili ancora di A , e C (§ 259 . Dunque , prese A , e C per conseguenti , e B , e D per antecedenti , le aliquote simili L , e M de' conseguenti A , e C sono aliquote simili ancora degli antecedenti B , e D . Perciò $B : A = D : C$ (§ 257) . Ch'è ciò , che bisognava dimostrare .

PROP. XIV. TEOR. XIV.

Fig.84 274. Sia $AB : BC = DE : EF$. Dico che , componendo , sta $AC : CB = DF : FE$.

DIMOSTRAZIONE.

S' intendano essere L , ed M le aliquote simili di BC , EF , che si possono prendere anche per aliquote simili di AB , DE (§ 259) . Misurando L , ed M rispettivamente un' istesso numero di volte AB , DE , e un' istesso numero di volte BC , EF ; misureranno ancora L , ed M l'istesso numero di volte AC , DF . Dunque L , ed M sono aliquote simili sì di BC , EF , che di AC , DF .

DF. E perciò $AC : CB = DF : FE$ (§ 257).
Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. XV. TEOR. XV.

275. Sia $AC : CB = DF : FE$. Dico che, dividendo, sarà $AB : BC = DE : EF$.

DIMOSTRAZIONE.

S' intendano essere L, ed M le aliquote simili di BC, ed EF, che si possono anche prendere per aliquote simili di AC, e DF. Misurando L, ed M rispettivamente un' istesso numero di volte BC, EF, e un' istesso numero di volte AC, DF; misureranno ancora L, ed M l' istesso numero di volte AB, DE. Dunque L, ed M sono aliquote simili sì di BC, ed EF, che di AB, e DE. E perciò $AB : BC = DE : EF$ (§ 257). Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. XVI. TEOR. XVI.

276. Sia $AB : BC = DE : EF$. Dico essere ancora $AB : AC = DE : DF$.

DIMOSTRAZIONE.

Essendo $AB : BC = DE : EF$; sarà, invertendo, $CB : BA = FE : ED$ (§ 173); e, componendo, $CA : AB = FD : DE$ (§
L 2 274).


274) . Onde , di nuovo invertendo , farà
 $AB : AC = DE : DF$. Ch'è ciò , che bi-
 sognava dimostrare .

PROP. XVII. TEOR. XVII.

277. Sia $AC : CB = DF : FE$. Dico che ,
 convertendo , farà $CA : AB = FD : DE$.

DIMOSTRAZIONE.

Essendo $AC : CB = DF : FE$; dividen-
 do , farà $AB : BC = DE : EF$ (§ 275);
 onde $AB : AC = DE : DF$ (§ prec.); e ,
 invertendo , farà $CA : AB = FD : DE$.
 Ch'è ciò , che bisognava dimostrare .



C A P. IV.

*Delle proprietà della proporzione , che
 ha tutt' i termini omogenei .*

DEFINIZIONE.

278. Si dirà che i termini d'una propor-
 zione si *permutano* , quando si paragona l'an-
 tedecente coll' antecedente , e l' conseguente
 col conseguente .

PROP.

PROP. XVIII. TEOR. XVIII.

279. *Sieno nella proporzione $A : B = C : D$ Fig. 80
D tutt' i termini omogenei . Dico che , per-
mutando , sarà $A : C = B : D$.*

D I M O S T R A Z I O N E .

Imperciocchè la ragione di $A : C$ è composta dalle ragioni di $A : B$, e di $B : C$, e la ragione di $B : D$ è composta dalle ragioni di $B : C$, e di $C : D$ (§ 267) . Ma le componenti dell' una , cioè le ragioni di $A : B$, e di $B : C$, sono uguali alle componenti dell' altra , cioè alle ragioni di $B : C$, e di $C : D$. Sicchè le composte , cioè le ragioni di $A : C$, e di $B : D$ sono anche uguali (§ 256) . Per la qual cosa $A : C = B : D$. Ch' è ciò , che bisognava dimostrare .

C O R O L L A R I O I .

280. Sieno A , e C due grandezze omogenee , ed L , e M sieno aliquote simili di esse ; faranno A , C , L , M tutte grandezze omogenee , e faranno le ragioni di $A : L$, e di $C : M$ uguali (§ 257) . E perciò $A : L = C : M$. Onde , permutando , sarà $A : C = L : M$. Sicchè le grandezze omogenee hanno tra esse l' istessa ragione delle parti aliquote simili .

COROLLARIO II.

281. Sieno in oltre A, B, C, D quattro grandezze omogenee proporzionali, ed A sia la massima. Essendo $A : B = C : D$, ed $A : C = B : D$; ed essendo nella prima di tali proporzioni B minore di A , farà D minore di C ; e nella seconda C minore di A , farà D minore di B (§ 252). Dunque se A è la massima, D è la minima.

PROP. XIX. TEOR. XIX.

Fig. 85 282. Sieno AB, CD, E, F quattro grandezze omogenee proporzionali, e AB sia la massima. Dico essere la somma della massima AB , e della minima F maggiore della somma delle altre due $CD, ed E$.

DIMOSTRAZIONE.

Da AB si tagli $AG = E$, e da CD si tagli $CH = F$. Essendo per l'ipotesi $AB : CD = E : F$, farà $AB : CD = AG : CH$; e, permutando, farà $AB : AG = CD : CH$ (§ 279). Sicchè, convertendo, farà pure $AB : BG = CD : DH$ (§ 277). Ma per l'ipotesi è AB maggiore di CD . Dunque BG è maggiore di DH (§ 252). E perciò, aggiugnendo alla maggiore GB la somma di AG , ed F , e alla minore DH la somma

ma

ma di E, e CH, farà la somma di AB, ed F maggiore della somma di CD, ed E (§ 54). Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. XX. TEOR. XX.

283. Sia $AB : DE = BC : FE$. Dico Fig. 84 che sarà ancora $AC : DF = AB : DE = BC : EF$.

DIMOSTRAZIONE.

Essendo $AB : DE = BC : EF$; farà, permutando, $AB : BC = DE : EF$ (§ 279), e componendo $AC : CB = DF : FE$ (§ 274); e, di nuovo permutando, $AC : DF = BC : EF$, e perciò anche $AC : DF = AB : DE$. Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. XXI. TEOR. XXI.

284. Sia $AC : DF = BC : FE$. Dico che sarà ancora $AB : DE = AC : DF$.

DIMOSTRAZIONE.

Essendo $AC : DF = CB : FE$; farà, permutando, $AC : CB = DF : FE$ (§ 279), e, convertendo, $AC : AB = DF : DE$ (§ 277). Onde, invertendo, $AB : AC = DE : DF$ (§ 273); e, di nuovo permutando, $AB : DE$
L 4
 $= AC :$

= AC : DF . Ch'è ciò , che bisognava dimostrare .



C A P . V.

Della teorica delle grandezze , che hanno tra esse ragioni ordinate , e perturbate , e di ciò , che da tale teorica deriva .

DEFINIZIONE.

Fig 83 285. Sieno le grandezze A , B , C , D , E , F , ec. omogenee tra esse , e queste altre L , M , N , O , P , Q , ec, anche tra esse omogenee . Si diranno le prime avere *ragioni ordinate* alle seconde , se le ragioni di A : B , di B : C , di C : D , di D : E , di E : F faranno rispettivamente uguali alle ragioni di L : M , di M : N , di N : O , di O : P , di P : Q ; si diranno poi le istesse prime grandezze avere *ragioni perturbate* alle seconde , se le ragioni di A : B , di B , C , di C : D , di D : E , di E : F faranno rispettivamente uguali alle ragioni di P : Q , di O : P , di N : O , di M : N : di L : M .

PROP.

PROP. XXII. TEOR. XXII.

286. *Se qualunque numero di grandezze omogenee A, B, C, D, E, F , ec. hanno ragioni ordinate, o perturbate ad altrettante grandezze anche tra esse omogenee L, M, N, O, P, Q , ec. . Dico che le prime, e le ultime sono in ambidue i casi proporzionali, cioè che $A : F = L : Q$.*

DIMOSTRAZIONE.

Imperciocchè la ragione di $A : F$ è composta dalle ragioni di $A : B$, di $B : C$, di $C : D$, di $D : E$, di $E : F$, e la ragione di $L : Q$ è composta dalle ragioni di $L : M$, di $M : N$, di $N : O$, di $O : P$, di $P : Q$ (§ 268). Ma le componenti dell'una in ambidue i casi sono rispettivamente uguali alle componenti dell'altra (§ prec.). Dunque le ragioni di $A : F$, e di $L : Q$, che sono le composte, sono anche uguali (§ 266). E perciò in ambidue i casi $A : F = L : Q$. Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. XXIII. TEOR. XXIII.

287. *Se qualunque numero di grandezze omogenee A, B, C, D, E, F , ec. hanno ragioni ordinate ad altrettante grandezze $L, M,$*

M, N, O, P, Q, ec., che sono tra esse pure omogenee. Dico essere la somma di quelle all'ultima F, come la somma di queste all'ultima Q.

DIMOSTRAZIONE.

Essendo $A : B = L : M$ per l'ipotesi ; farà, componendo, $A + B : B = L + M : M$ (§ 274). Ma per l'ipotesi $B : C = M : N$. Dunque $A + B, B, C$ hanno ragioni ordinate ad $L + M, M, N$ (§ 285); e perciò $A + B : C = L + M : N$ (§ prec.). Onde, di nuovo componendo, $A + B + C : C = L + M + N : N$. E' in oltre $C : D = N : O$. Dunque le grandezze $A + B + C, C, D$ hanno pure ragioni ordinate ad $L + M + N, N, O$. Sicchè $A + B + C : D = L + M + N : O$ (§ prec.). Onde, componendo un'altra volta, farà la somma di A, B, C, D a D , come la somma di L, M, N, O ad O . Dell'istesso modo procedendo innanzi si trova essere la somma di A, B, C, D, E, F ad F , come la somma di L, M, N, O, P, Q a Q . Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

COROLLARIO.

288. Se $A, B, C, D, E, F, ec.$ ed $L, M, N, O, P, Q, ec.$ sono tutte grandez-

ze omogenee, e le ragioni di $A : L$, di $B : M$, di $C : N$, di $D : O$, di $E : P$, di $F : Q$ sono tutte uguali; perchè, permutandole, sono anche le ragioni di $A : B$, di $B : C$, di $C : D$, di $D : E$, di $E : F$ rispettivamente uguali alle ragioni di $L : M$, di $M : N$, di $N : O$, di $O : P$, di $P : Q$; avranno A, B, C, D, E, F ragioni ordinate ad L, M, N, O, P, Q (§ 285). E perciò la somma di quelle sta ad F , come la somma di queste a Q ; e, permutando, la somma di quelle sta alla somma di queste, come l'ultima F all'ultima Q , o come $E : P$, o come $D : O$, ec. . Sicchè se più ragioni sono tra esse uguali, e le grandezze sono tutte omogenee, la somma di tutti gli antecedenti sta alla somma di tutt' i conseguenti, come uno degli antecedenti al suo conseguente.

PROP. XXIV TEOR. XXIV.

289. *Sieno A, B, C, D quattro grandezze proporzionali, e sieno L, M, N, O quattro altre, delle quali sieno proporzionali due agli antecedenti, e due altre ai conseguenti, cioè $L : A = N : C$, ed $M : B = O : D$. Dico che anche L, M, N, O sono tra esse proporzionali.*

DIMOSTRAZIONE.

Essendo $L : A = N : C$, $A : B = C : D$, $M : B = O : D$, ovvero, invertendo, $B : M = D : O$; avranno L , A , B , M ragioni ordinate ad N , C , D , O (§ 285). Dunque $L : M = N : O$ (§ 286). Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. XXV. TEOR. XXV.

290. *Se vi sono due proporzioni, ed i due conseguenti dell' una sono rispettivamente uguali a' due conseguenti dell' altra. Sarà sì la somma, che la differenza delli due primi antecedenti di ambedue le proporzioni al conseguente comune di essi, come sì la somma, che la differenza degli altri due antecedenti al conseguente comune pure di essi.*

DIMOSTRAZIONE.


Sieno $AB : G = DE : H$, e $BC : G = EF : H$.

I. Essendo $AB : G = DE : H$, e $BC : G = EF : H$, ovvero, invertendo, $G : BC = H : EF$ (§ 273); avranno AB , G , BC ragioni ordinate a DE , H , EF (§ 285). Onde farà $AB : BC = DE : EF$; e, componendo, farà $AC : CB = DF : FE$ (§ 274). Ma $CB : G = EF : H$ per l'ipotesi. Dun-

Dunque anche AC , CB , G hanno ragioni ordinate a DF , FE , H (§ 285). E perciò $AC : G = DF : H$ (§ 286).

II. Si taglino $BL = BC$, $EM = EF$. Essendo $AB : G = DE : H$, e $BC : G = EF : H$, o $BL : G = EM : H$, ovvero, invertendo, $G : BL = H : EM$; avranno AB , G , BL ragioni ordinate a DE , H , EM (§ 285). Onde farà $AB : BL = DE : EM$ (§ 286); e dividendo, farà $AL : LB = DM : ME$. Ma $BL : G = EM : H$. Dunque anche AL , LB , G hanno ragioni ordinate a DM , ME , H (§ 285). Sicchè farà $AL : G = DM : H$ (§ 286). Ch'è quanto bisognava dimostrare.

Fine del terzo Libro.



LIBRO IV.

Delle teoriche più rilevanti
della Geom. Piana che dal-
la dottrina della ragione,
e della proporzione geo-
metrica derivano.



CAP. I.

*Delle ragioni uguali, che si possono
avere con dividere uno, o due lati
di qualunque triangolo.*

L E M M A.

Fig.87 291. *Se il lato AB di qualunque trian-
golo ABC si divide in qualsivoglia numero
di parti uguali AD , DE , EF , FB , e pe'
punti D , E , F si tirano le rette DG , EH ,
 FI parallele a BC ; divideranno tali rette
il lato AC in altrettanti parti AG , GH ,
 HI , IC anche tra esse uguali.*

DI-

DIMOSTRAZIONE.

Per gli punti G , H , I si tirino GK , HL , IM parallele ad AB (§ 86). Essendo $GK \parallel DE$, $HL \parallel EF$, $IM \parallel FB$ (§ 104); faranno AD , GK , HL , IM tutte uguali. Onde i triangoli ADG , GKH , HLI , IMC sono equiangoli, e hanno uguali i lati AD , GK , HL , IM . Dunque AG , GH , HI , IC sono anche uguali tra esse (§ 100). Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. I. TEOR. I.

292. *Sia in qualunque triangolo tirata una retta: se è essa parallela a un lato, divide gli altri due lati in parti proporzionali; e se divide due lati in parti proporzionali, è parallela al terzo lato.* -

DIMOSTRAZIONE.

I. Sia nel triangolo ABC la DE paral-
lela a BC . S' intendano le AD , DB divise in parti uguali all'aliquota comune di esse, e per gli punti delle divisioni s' intendano tirate delle rette parallele tutte a BC ; divideranno tali rette in altrettante parti uguali anche AE , EC (§ prec.). Sicchè una delle parti, nelle quali si sono
con-

concepite divise AD , DB , e una di quelle, nelle quali verrebbero divise AE , EB dalle dette parallele, sono aliquote simili sì di DB , EC , che di AD , AE . E perciò $AD : DB = AE : EC$ (§ 257).

II. Divida DE i lati AB , AC in parti proporzionali, cioè che sia $AD : DB = AE : EC$. Se si nega essere DE parallela a BC ; si tiri per D , s'è possibile, un'altra retta DF parallela a BC . Sarà la ragione di $AF : FC$ uguale alla ragione di $AD : DB$ per la parte 1. Ma per l'ipotesi la ragione di $AE : EC$ è uguale a quella di $AD : DB$. Dunque $AF : FC = AE : EC$ (§ 245); e, componendo, sarà $AC : CF = AC : CE$ (§ 274). Onde $CF = CE$ (§ 264), cioè il tutto è uguale alla parte. Ma ciò è impossibile (§ 59). Dunque è impossibile che non sia DE parallela a BC . Per la qual cosa se in qualunque triangolo, ec., Ch'è quanto bisognava dimostrare.

PROP. II. TEOR. II.

Fig. 89 293. *Sieno in qualunque triangolo ABC tirate quante rette si sieno DG , EH , FI : se tali rette sono parallele a BC , le parti di AB hanno ragioni ordinate alle parti di AC ; e se le parti di AB hanno ragioni ordinate alle parti di AC , le dette rette sono tutte parallele a BC .*

DI.

DIMOSTRAZIONE.

I. Sieno DG , EH , FI parallele a BC . Per G , e H si tirino GM , HO parallele ad AB . Saranno $GK = DE$, $HN = KL = EF$, $NO = FB$ (§ 104). Essendo nel triangolo AEH la DG parallela ad EH , farà $AG : GH = AD : DE$ (§ 292). Similmente, essendo nel triangolo GLI la KH parallela ad LI , farà $GH : HI = GK : KL = DE : EF$. Finalmente, essendo in HOC la IN parallela ad OG , farà $HI : IC = HN : NO = EF : FB$. Dunque le parti AG , GH , HI , IC hanno ragioni ordinate alle parti AD , DE , EF , FB (§ 285).

II. Abbiamo le parti AD , DE , EF , FB ragioni ordinate alle parti AG , GH , HI , IC . Sarà $AB : BF = AC : CI$ (§ 287), e dividendo $AF : FB = AI : IC$ (§ 275). Dunque FI è parallela a BC (§ 292). Similmente si dimostra essere EH parallela ad FI , e conseguentemente a BC , e DC parallela ad EH , e per conseguenza a BC . Sicchè DG , EH , FI sono tutte parallele a BC . Ch'è quanto bisognava dimostrare.

PROP. III. TEOR. III.

294. *Sia in qualunque triangolo ABC ti-Fig. 90.
rata dal vertice dell'angolo ABC la retta
 BD : se tale retta divide l'angolo ABC in
Tom. II. M due*

due parti uguali, divide ancora la base AC nella ragione de' lati, cioè che $AD : DC = AB : BC$; e se divide la base nella ragione de' lati, divide ancora l'angolo ABC in due parti uguali.

DIMOSTRAZIONE.

Per C si tirì CE parallela a BD , e si prolunghi, finchè s'unisca con AB prolungata in E .

I. Sia l'angolo ABD uguale a DBG . Essendo per le parallele BD , CE l'angolo $BCE = DBG$, e $BEG = ABD$ (§ 83). Sarà l'angolo $BCE = BEG$ (§ 51). Dunque $BC = BE$ (§ 93); e conseguentemente $AB : BC = AB : BE$ (292). Sicchè $AD : DC = AB : BC$ (§ 245).

II. Sia ora $AD : DC = AB : BC$. Per le parallele DB , CE sarà $AD : DC = AB : BE$ (§ 292). Dunque $AB : BC = AB : BE$ (§ 245). E perciò $BC = BE$ (§ 264); e conseguentemente l'angolo $BEG = BCE$ (§ 91). Ma $ABD = BEG$, e $DBG = BGE$ (§ 83). Sicchè l'angolo $ABD = DBG$. Ch'è quanto bisognava dimostrare.



C A P. II.

*De' caratteri da conoscere la simiglianza
de' triangoli , e quella de'
parallelogrammi.*

DEFINIZIONE.

295. Due figure rettilinee si dicono *simili*, se sono gli angoli dell' una uguali rispettivamente agli angoli dell' altra , e hanno di più i lati , che formano gli angoli uguali , tra essi proporzionali .

COROLLARIO I.

296. Sicchè i rettilinei ABCD , EFGH Fig. 91
sono simili , se sono gli angoli in A , B , C ,
D rispettivamente uguali agli angoli in E ,
F , G , H , e sono di più $AB : BC = EF :$
 FG , $BC : CD = FG : GH$, $CD : DA =$
 $GH : HE$, $DA : AB = HE : EF$.

COROLLARIO II.

297. Sieno in oltre i rettilinei ABCD ,
LMNO ambidue simili al terzo EFGH .
Saranno agli angoli in E , F , G , H ugua-
M 2 li

li rispettivamente sì gli angoli in A, B, C, D , che gli angoli in L, M, N, O , e a' lati EF, FG, GH, HE rispettivamente proporzionali sì AB, BC, CD, DA , che LM, MN, NO, OL . Onde gli angoli in A, B, C, D sono rispettivamente uguali agli angoli in L, M, N, O , e i lati AB, BC, CD, DA sono rispettivamente proporzionali ad LM, MN, NO, OL . Sicchè i poligoni rettilinei simili a un terzo, sono anche tra di loro simili.

PROP. IV. TEOR. IV.

Fig. 92 289. *Sieno i triangoli ABC, DEF equiangoli, cioè sieno l'angolo $ABC = DEF, BCA = EFD, CAB = EDF$. Dico che tali triangoli sono simili.*

DIMOSTRAZIONE.

Si taglino $BL = DE, BM = EF$ (§ 50), e si congiunga LM . Saranno $LM = DF$, e l'angolo BLM uguale ad EDF (§ 98), Ma l'angolo BAC è pure uguale per l'ipotesi all'angolo EDF . Sicchè l'angolo $BLM = BAC$ (§ 51); e perciò LM è parallela ad AC (§ 82). Onde $AL : LB = CM : MB$ (§ 292); e, componendo, $AB : BL = CB : BM$ (§ 274); e, permutando, $AB : BC = LB : PM = DE : EF$. Similmente si dimostra essere $BC : CA = EF : FD$, e $CA : AB = FD :$

$= FD : DE$. Dunque i triangoli ABC , DEF , che sono equiangoli, hanno anche i lati, che formano gli angoli uguali, proporzionali; e perciò sono simili (§ 295). Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

COROLLARIO.

199. Sicchè qualora i triangoli ABC , DEF sono equiangoli, si hanno le seguenti proporzioni $AB : BC = DE : EF$, $BC : CA = EF : FD$, $CA : AB = FD : DE$, e sono conseguentemente omologhi i lati, che sono opposti ad angoli uguali.

PROP. V. TEOR. V.

300. *Abbiano i triangoli ABC , DEF i lati proporzionali, cioè $AB : BC = DE : EF$, $BC : CA = EF : FD$, $CA : AB = FD : DE$. Dico tali triangoli essere pure simili.*

DIMOSTRAZIONE.

Si taglino $BL = DE$, $BM = EF$, e si congiunga LM . Sarà $AB : BC = LB : BM$; e, permutando, $AB : BL = CB : BM$ (§ 279); e, dividendo, $AL : LB = CM : MB$ (§ 275). Onde LM è parallela ad AC (§ 292); e conseguentemente il triangolo LBM è equiangolo col triangolo ABC . Sicchè $ML : LB = CA : AB$ (§

M 3

prec.

prec.) = $FD : DE$. E perciò $LM = DF$ (§ 264); e conseguentemente il triangolo DEF è equiangolo col triangolo LBM (§ 99), e perciò equiangolo col triangolo ABC . Per la qual cosa i triangoli ABC , DEF sono simili (§ 295). Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

COROLLARIO.

301. Essendo gli angoli in A , B , C rispettivamente uguali agli angoli in D , E , F : è chiaro che gli angoli uguali sono opposti ai lati omologhi.

PROP. VI. TEOR. VI.

302. *Abbiano i triangoli ABC , DEF l'angolo $ABC = DEF$, e i lati AB , BC proporzionali ai lati DE , EF . Dico tali triangoli essere anche simili.*

DIMOSTRAZIONE.

Si taglino $BL = DE$, $BM = EF$, e si congiunga LM . Sarà il triangolo LBM equiangolo con DEF ; e farà $AB : BC = LB : BM$; onde, permutando, e dividendo, $AL : LB = CM : MB$ (§§ 279, e 275). Sicchè LM è parallela ad AC (§ 292). E perciò il triangolo ABC è equiangolo con LBM , e conseguentemente con DEF . Per
la

la qual cosa i triangoli ABC , DEF sono simili (§ 298). Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. VII. TEOR. VII.

303. *Abbiano i triangoli ABC , DEF i lati BA , AC proporzionali a' lati ED , DF , e degli angoli non formati da tali lati i due ABC , DEF sieno uguali, e gli altri due ACB , DFE sieno della medesima specie. Dico tali triangoli essere pure simili.*

DIMOSTRAZIONE.

Se si nega essere il triangolo ABC simile a DEF , sarà l'angolo BAC maggiore, o minore di EDF . Sia, s'è possibile, BAC maggiore di EDF . Si faccia in A l'angolo $BAG = EDF$; sarà $AGB = DFE$ (§ 89). Onde $BA : AG = ED : DF$ (§ 299). Ma per l'ipotesi $BA : AC = ED : DF$. Dunque $BA : AG = BA : AC$ (§ 245); e perciò $AG = AC$ (§ 264), e conseguentemente l'angolo $ACG = AGC$ (§ 91). Sono gli angoli ACB , DFE per l'ipotesi dell'istessa specie, vale a dire ambidue o ottusi, o acuti. Dunque anche gli angoli AGC , AGB sono ambidue o ottusi, o acuti. Ma ciò è impossibile (§ 89). Dunque è impossibile che sia l'angolo BAC maggiore di EDF . Similmente si può dimostrare non essere

BAC minore di EDF . Dunque è $BAC = EDF$, e conseguentemente $ACB = DFE$ (§ 89) . E perciò i triangoli ABC , DEF sono equiangoli , e conseguentemente simili (§ 298) . Ch' è ciò , che bisognava dimostrare .

PROP. VIII. TEOR. VIII.

Fig. 93 304. *Abbia il triangolo ABC l'angolo ABC retto , e sia BD perpendicolare ad AC . Dico essere i triangoli ABD , BDC simili tra essi , e simili all' intero ABC .*

DIMOSTRAZIONE.

Imperciocchè i triangoli ADB , ABC hanno l'angolo $ADB = ABC$ (§ 61) , l'angolo in A comune , e conseguentemente l'angolo $ABD = ACB$ (§ 89) . Dunque i triangoli ADB , ABC sono simili (§ 298) . In oltre i triangoli DBC , ABC hanno l'angolo $BDC = ABC$ (§ 61) , l'angolo in C comune , e conseguentemente l'angolo $DBC = BAC$. Sicchè i triangoli DBC , ABC sono pure simili (§ 298) . Finalmente i due triangoli ADB , BDC , come simili ad ABC , sono anche simili tra essi (§ 297) . Ch' è quanto bisognava dimostrare .

COROLLARIO

305. Dalli tre triangoli simili ABC , ADB , BDC si ricavano le tre seguenti proporzioni continue $CA : AB = AB : AD$, $AC : CB = CB : CD$, e $AD : DB = DB : DC$.

PROP. IX. TEOR. IX.

306. *Abbiano i parallelogrammi AC , EG Fig. 94 l'angolo $ABC = EFG$ e i lati AB , BC proporzionali ai lati EF , FG . Dico essere tali parallelogrammi simili tra essi.*

DIMOSTRAZIONE.

Avendo i parallelogrammi AC , EG l'angolo $ABC = EFG$, faranno l'angolo $BCD = FGH$, $CDA = GHE$, $DAB = HEF$ [§ 83, e 104]. In oltre, essendo $AB : BC = EF : FG$, farà $DC : CB = HG : GF$, e, invertendo, $BC : CD = FG : GH$ [§ 273]. Similmente si dimostra essere $CD : DA = GH : HE$, e $DA : AB = HE : EF$. Sicchè i parallelogrammi AC , EG sono simili (§ 295). Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP.

PROP. X. TEOR. X.

Fig. 24 307. *Sieno i parallelogrammi GE, FH esistenti intorno la diagonale del parallelogrammo BD. Dico essere i parallelogrammi GE, FH simili tra essi, e simili all' intero BD.*

DIMOSTRAZIONE.

Essendo i triangoli CFO, CDA equiangoli; farà $OF : FC = AD : DC$ (§ 292). Sicchè i parallelogrammi FH, DB hanno l'angolo $OFC = ADC$, e i lati OF, FC proporzionali ad AD, DC, e perciò sono simili tra essi (§ prec.). Dell'istesso modo si dimostra essere GE simile a DB. Finalmente i parallelogrammi FH, GE sono ambedue simili a DB, onde sono anche simili tra essi (§ 297). Ch'è quanto bisognava dimostrare.

AVVERTIMENTO.

308. Tutti gli altri rettilinei non hanno caratteri speciali per poter conoscere la simiglianza di essi; e perciò non si veggono qui soggiunti. Intanto soggiugniamo la seguente, perchè è la conversà di quest'ultima.


PROP.

PROP. XI. TEOR. XI.

309. *Sieno i parallelogrammi BD , GE simili, e abbiano l'angolo GAE comune. Dico che il parallelogrammo GE è intorno la diagonale di DB .*

DIMOSTRAZIONE.

Si tirino ne' parallelogrammi DB , GE le diagonali AC , AO . Essendo i parallelogrammi DB , GE simili; faranno gli angoli AGO , ADC uguali, ed i lati AG , GO proporzionali a' lati AD , DC . Onde i triangoli AGO , ADC sono equiangoli (§ 302); e perciò l'angolo $GAO = DAC$. Onde la diagonale AO cade su AC ; e conseguentemente il parallelogrammo GE è intorno la diagonale di DB . Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.



C A P. III.

Del modo di dividere qualunque retta secondo qualsivoglia data ragione ; e del modo di trovare una retta , che sia in proporzione con altre rette date .

D E F I N I Z I O N E .

Fig. 42 310. Una retta qualunque AB si dice *se-
gata secondo l'estrema , e media ragione* in C , se l'intera AB sta alla parte maggiore BG , come l'istessa BC alla parte minore AC .

PROP. XII. PROBL. I.

311. *Data qualunque retta , tagliare da essa qualsivoglia sua parte .*

S O L U Z I O N E .

Sia da tagliarsi da AB la sua terza parte .

1. Si tiri da A l' indefinita AO , che faccia con AB qualunque angolo OAB .

2. In AO si prenda ad arbitrio il punto D ; e DO si taglino DE , EF uguali ambedue ad AD (§ 50) .

3. Si

3. Si congiunga BF ; e per D si tiri DC parallela a BF (§ 86).

Dico essere AC la terza parte di AB .

DIMOSTRAZIONE.

Essendo per le parallele BF , DC la BC :
 $CA = FD : DA$ (§ 292); farà, componendo, $BA : AC = FA : AD$ (§. 274).
 Ma AD è terza parte di AF . Dunque AC è anche terza parte di AB . Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. XIII. PROBL. II.

312. *Date due rette AB , AC , delle quali Fig. 89
 AB sia indivisa, e AC sia divisa nelle parti
 AG , GH , HI , IC , dividere la AB in parti
 proporzionali alle parti di AC .*

SOLUZIONE.

1. Si dispongano AB , AC in modo, che facciano in A qualsivoglia angolo CAB .

2. S'unisca BC ; e per G , H , I si tirino GD , HE , IF parallele a BC (§ 86).

Dico essere divisa AB nelle parti cercate.

DIMOSTRAZIONE.

Imperciocchè le parti AD , DE , EF ,
 FB sono proporzionali alle parti AG , GH ,
 HI ,

HI, IC (§ 293). Sicchè s'è divisa AB in parti proporzionali alle parti di AC. Ch'è ciò, che bisognava fare, e dimostrare.

PROP. XIV. PROBL. III.

313. *Data qualunque retta terminata dividerla in qualsivoglia numero di parti uguali.*

SOLUZIONE.

Fig.87 Sia da dividerfi AB in 4 parti uguali.

1. Da A si tiri l' indefinita AO, che faccia con AB qualunque angolo OAB.

2. Si prenda in AO ad arbitrio il punto G, e da GO si taglino tre altre parti GH, HI, IC uguali tutte ad AG (§ 50).

3. Si congiunga BC; e per G, H, I si tirino GD, HE, IF parallele a BC (§ 86).

Dico essere AB divisa in 4 parti uguali AD, DE, EF, FB.

DIMOSTRAZIONE.

Imperciocchè le parti AD, DE, EF, FB sono proporzionali alle parti AG, GH, HI, IC (§ 293). Ma queste sono uguali. Dunque sono uguali anche quelle (§ 244). Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP.

PROP. XV. PROBL. IV.

314. *Data una retta , dividerla secondo l'estrema , e media ragione.*

S O L U Z I O N E .

Sia AB la retta data .

Si divida AB in C in modo , che 'l rettangolo fatto da BA , e AC sia uguale al quadrato di BC (§ 139).

Dico che AB è divisa in C secondo l'estrema , e media ragione .

D I M O S T R A Z I O N E .

Si descriva il cerchio BDC , che abbia per diametro , o per corda BC ; e , tirata da A la tangente AD (§ 154) , si congiungano DB , DC . Sarà il quadrato di AD uguale al rettangolo fatto da BA , e AC (§ 186) , e conseguentemente uguale al quadrato di BC . Onde $AD = CB$ (§ 116). In oltre i triangoli ADB , ACD sono simili , perchè hanno l'angolo $ADC = DBA$ (§ 174) , l'angolo in A comune , e conseguentemente l'angolo $ADB = ACD$ (§ 89). Sicchè $BA : AD = AD : AC$ (§ 299) ; e perciò $AB : BC = BC : AC$. Per la qual cosa s'è divisa AB in C secondo l'estrema ,
e me-

e media ragione . Ch'è ciò , che bisognava fare, e dimostrare .

COROLLARIO.

315. Quindi l'istesso è dividere una retta secondo l'estrema , e media ragione , che dividerla in un punto tale , che 'l rettangolo fatto dall'intera retta , e da una delle parti sia uguale al quadrato dell'altra parte.

PROP. XVI PROBL. V.

316. *Date tre rette , trovare la quarta proporzionale.*

SOLUZIONE.

Fig.97 Sieno A, B, C le tre rette date.

1. Si faccia qualunque angolo QLN ; e si taglino $LM = A$, $MN = B$, $LO = C$ (- § 50).

2. Si congiunga MO ; e per N si tiri NP parallela ad MO (§ 86).

Dico essere OP la quarta proporzionale cercata .

DIMOSTRAZIONE.

Essendo $LM : MN = LO : OP$ (§ 292); farà $A : B = C : OP$. Dunque OP è quarta proporzionale in ordine ad A, B, C. Ch'è ciò

è ciò , che bisognava dimostrare.

PROP. XVII. PROBL. VI.

317. *Date due rette , trovare la terza proporzionale.*

S O L U Z I O N E .

Sieno A , e B le due rette date .

1. Si faccia qualunque angolo NLQ ; e si taglino LM = A , MN = B , ed LO = Fig. 98
B (§ 50) .

2. Si congiunga MO ; e per N si tiri NP parallela ad MO (§ 86) .

Dico essere OP la terza proporzionale cercata .

D I M O S T R A Z I O N E .

Essendo LM : MN = LO : OP (§ 292) ; farà A : B = B : OP . Sicchè OP è terza proporzionale in ordine ad A , e B . Ch' è ciò , che bisognava dimostrare .

PROP. XVIII. PROBL. VII.

318. *Date due rette , trovare la mezza proporzionale.*

SOLUZIONE.

Fig. 99 Sieno A , e B le due rette date.

1. Si tiri l'indeterminata LN ; e da essa si taglino $LM = A$, $MN = B$.

2. Su LN si descriva il mezzo cerchio LON ; e da M s'innalzi su LN la perpendicolare MO (§ 72), che interseca la periferia LON in O .

Dico essere MO la mezza proporzionale


DIMOSTRAZIONE.

Si congiungano le rette LO , ON . Essendo l'angolo LON retto (§ 169); farà $LM : MO = MO : MN$ (§ 305); e perciò $A : MO = MO : B$. Sicchè MO è mezza proporzionale tra A , e B . Ch'è ciò che bisognava dimostrare.

AVVERTIMENTO.

319. Si noti che coll'istesso metodo si possono trovare ancora tra due rette date 3, 7, 15, 31, ec. mezze proporzionali. Il trovarne poi tante, quante ne contrassegnano i numeri, che tramezzano tra 1, 3, 7, 15, 31, ec., appartiene alla Geom. sublime, e non alla elementare.

CAP.



C A P. IV.

Delle ragioni de' triangoli , e de' parallelogrammi .

DEFINIZIONE.

320. Si dice *altezza* d'un triangolo , o d'un parallelogrammo la perpendicolare calata sulla base dal vertice dell' angolo opposto all' istessa base .

COROLLARIO.

321. Quindi i triangoli , ed i parallelogrammi racchiusi tra le medesime parallele , sono d' uguali altezze .

PROP. XIX. TEOR. XII.

322. *I triangoli , ed i parallelogrammi , che hanno uguali altezze , sono tra essi nella ragione delle basi .*

DIMOSTRAZIONE.

Sieno i triangoli ACB, BCE, ed i paral-
lelogrammi BD , BF racchiusi tra le paral-

N 2

le.

lele AE , DF , e per conseguenza d' uguali altezze. S' intendano le basi AB ; BE divise nelle parti AG , GH , HI , IB , BK , KL , LE , uguale ognuna all' aliquota comune di esse; e s' intendano tirare le rette CG , CH , CI , CK , CL . Saranno tutt' i piccioli triangoli ACG , GCH , HCI , ICB , BCK , KCL , LCE uguali tra essi (§ 110). Onde il triangolo ACG , e la sua base AG sono aliquote simili sì del triangolo BCE , e della sua base BE , che del triangolo ACB , e della sua base AB . E perciò alla ragione delle basi AB , BE è uguale la ragione de' triangoli ACB , BCE (§ 257), e conseguentemente anche quella de' parallelogrammi BD , BF , che sono doppi de' triangoli ACB , BCE . Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. XX. TEOR. XIII.

Fi. 101 323. *I triangoli ACB , BGE , ed i parallelogrammi BD , BF , che hanno le basi AB , BE uguali, e le altezze CH , GI disuguali, sono tra essi nella ragione delle altezze CH , GI .*

DIMOSTRAZIONE.

Si dispongano i parallelogrammi BD , BF in modo, che AB , BE facciano una retta continuata; e, prolungata FG in O , si congiun-

giungano le rette AO, BO. Saranno il triangolo $AOB = BGE$ (§ 110), ed $OH = GI$. In oltre, essendo alla ragione di $CH : HQ$ uguale sì quella di $CBH : OBH$, che quella di $CAH : OAH$ (§ prec.); sarà $CBH : OBH = CAH : OAH$ (§ 245); e, permutando, $CBH : CAH = OBH : OAH$ (§ 279). Onde, componendo, e permutando, sarà l'intero triangolo ACB all'intero AOB , o pure $ACB : BGE = CAH : OAH = CH : HO = : CH : GI$. Finalmente i parallelogrammi CD , BF sono nella ragione de' triangoli ACB , BGE (§ 280). Dunque anche i parallelogrammi BD , BF sono tra essi nella ragione delle altezze CH , GI (§ 245). Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. XXI. TEOR. XIV.

324: *I triangoli ADB, EHF, ed i paral. Fi. 102*
logrammi AC, EG, che hanno disuguali
basi AB, EF, e disuguali altezze DO,
HP, sono tra essi in ragione composta da
quella delle basi, e da quella delle altezze.

DIMOSTRAZIONE.

Si faccia il parallelogrammo IL , che abbia l'altezza $MQ = DO$, e la base $IK = EF$; e si tiri in esso la diagonale MK . Essendo i triangoli ADB , IMK , EHF tre

N 3

gran-

grandezze omogenee, farà la ragione di $ADB:EHF$ composta dalle ragioni di $ADB:IMK$, e di $IMK:EHF$ (§ 267). Ma $ADB:IMK = AB:IK = AB:EF$ (§ 322), ed $IMK:EHF = MQ:HP = DO:HP$ (§ 323). Dunque la ragione di $ADB:EHF$ è composta dalle ragioni di $AB:EF$, e di $DO:HP$. Finalmente la ragione de' parallelogrammi AC, EG è uguale alla ragione de' triangoli ADB, EHF . Dunque anche la ragione de' parallelogrammi AC, EG è composta dalle ragioni di $AB:EF$, e di $DO:HP$. Ch' è ciò, che bisognava dimostrare.


PROP. XXII. TEOR. XV.

Fi. 103 325. *I triangoli ABC, EBG , ed i parallelogrammi BD, BF , che hanno un' angolo uguale a un' angolo, cioè $ABC = EBG$, sono tra essi pure in ragione composta da quelle de' lati, che formano gli angoli uguali, vale a dire composta dalle ragioni di $AB:BG$, e di $CB:BE$.*

DIMOSTRAZIONE.

Si dispongano i parallelogrammi in modo, che AB , e BG facciano una retta continuata; faranno, per gli angoli uguali ABC, EBG , una retta continuata anche CB, BE (§ 78). Di più da' punti C , ed
E

E si calino fu AG le perpendicolari CI, EH. Effendo i triangoli CBI, EBH equiangoli, farà $BC : CI = BE : EH$ (§ 299), e, permutando, $CB : BE = CI : EH$ (§ 279). Ma tanto la ragione de' triangoli ABC, EBG, quanto quella de' parallelogrammi BD, BF è composta dalle ragioni di AB : BG, e di CI : EH (§ prec.) Dunque tanto la ragione de' triangoli ABC, EBG, quanto quella de' parallelogrammi BD, BF è composta dalle ragioni di AB, BG, e di CB : BE. Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.



C A P. V.

Dell'uguaglianza de' triangoli, e de' parallelogrammi, che hanno le basi in ragione reciproca delle altezze; e dell'uguaglianza de' rettangoli formati da rette proporzionali.

PROP. XXIII. TEOR. XVI.

326. Se due triangoli ABD, EFH, o due parallelogrammi AC, EG sono uguali, la ragione delle basi AB, EF è reciproca di quella delle altezze DI, KH; e se la ragione delle basi è reciproca di quella delle altezze,

sì i triangoli ABD , EFH , che i parallelogrammi AC , EG , sono uguali.

DIMOSTRAZIONE.

Dall' altezza maggiore DI si tagli $IO=HK$, e si congiungano AO , BO .

I. Sieno uguali i triangoli ABD , EFH , e conseguentemente uguali i parallelogrammi AC , EG . Sarà la ragione del triangolo ABO : EFH uguale alla ragione dell' istesso triangolo ABO : ABD (§ 262). Ma ABO : $EFH = AB$: EF (§ 322), e ABO : $ABD = IO$: ID (§ 323) = HK : DI . Dunque AB : $EF = HK$: DI . Sicchè la ragione delle basi è reciproca di quelle delle altezze.

II. Sia la ragione delle basi reciproca di quella delle altezze. Sarà AB : $EF = HK$: $DI = OI$: DI . Ma AB : $EF = AOB$: EHF (§ 322), e OI : $DI = AOB$: ADB (§ 323). Dunque il triangolo AOB : $EHF = AOB$: ADB : E perciò è il triangolo $ADB = EHF$ (§ 264), e conseguentemente è il parallelogrammo $AC=EG$. Ch' è quanto bisognava dimostrare.

COROLLARIO.

327. Se è l'angolo $DAB=HEF$, i triangoli DAI , HEK sono equiangoli. Onde KH : $HE = ID$: DA (§ 299); e, per-

permutando, $KH:ID=HE:DA$ (§ 279). Dunque i triangoli ADB , EHF , ed i parallelogrammi AC , EG , che hanno l'angolo $DAB=HEF$, se sono uguali, hanno i lati, che formano sì fatti angoli uguali reciprocamente proporzionali, cioè $AB:EF=HE:DA$, e se hanno i detti lati reciprocamente proporzionali, sono tra essi uguali.

● PROP. XXIV. TEOR. XVII.

328. Se quattro rette A, B, C, D sono Fi. 105
proporzionali, il rettangolo fatto dalle due estreme A , e D è uguale al rettangolo fatto dalle due di mezzo B , e C ; e se A, B, C, D sono quattro rette tali, che 'l rettangolo fatto dall'estreme A , e D è uguale al rettangolo fatto dalle due di mezzo B , e C , sono elleno proporzionali.

D I M O S T R A Z I O N E.

Si facciano il rettangolo LN , che abbia il lato $LM=A$, $LO=D$, e 'l rettangolo PR , che abbia $PQ=B$, $PS=C$.

I. Sia $A:B=C:D$. Dunque $LM:PQ=PS:LO$. E perciò il rettangolo LN , fatto dalle estreme A , e D , è uguale al rettangolo PR , fatto dalle due di mezzo B , e C (§ prec.).

II. Sia il rettangolo LN , fatto dalle due estreme.

estreme A, e D, uguale al rettangolo PR, fatto dalle due di mezzo B, e C. Sarà LMJ: PQ = PS: LO (§ *prec.*). E perciò A: B = C: D. Ch' è quanto bisognava dimostrare.

COROLLARIO.

329. Se farà $B = C$, le quattro rette A, B, C, D si ridurranno a tre A, B, D, e 'l rettangolo PR si ridurrà al quadrato di B. E perciò, se tre rette A, B, D sono continuamente proporzionali, il rettangolo fatto dalle due estreme A, e D è uguale al quadrato di quella di mezzo B; e se A, B, D sono tre rette tali, che 'l rettangolo fatto dalle due estreme A, e D è uguale al quadrato di quella di mezzo B, tali rette A, B, D sono continuamente proporzionali.



C A P. VI.

Della ragione, e proporzionalità de' rettilinei simili; e de' principali probl. appartenenti alla teorica de' medesimi rettilinei simili.

L E M M A.

330. *Se dai vertici di due angoli uguali di due poligoni simili si tirano delle rette ai vertici degli angoli opposti; sì fatte rette dividono i poligoni in triangoli uguali di numero, e rispettivamente simili.*

DIMOSTRAZIONE.

Sieno i poligoni ABCDEF., LMNOPQ^{Fi. 106} simili, e dai vertici degli angoli uguali in A; ed L sieno tirate ai vertici degli angoli opposti le rette AC, AD, AE, LN, LO, LP. E' chiaro che quante rette sono tirate in uno, altrettante ne sono tirate nell' altro. Onde sì fatte rette dividono i poligoni in ugual numero di triangoli. In oltre, essendo i poligoni simili, sarà l'angolo in B = M, e $AB : BC = LM : MN$ (§295).

(§ 295). Dunque è l'angolo $BCA = MNL$, e per conseguenza $ACD = LNO$, ed il triangolo ABC simile ad LMN (§ 302). E perciò $AC : CB = LN : NM$. Ma $BC : CD = MN : NO$. Onde $AC : CD = LN : NO$ (§ 286). Sicchè anche i triangoli ACD , LNO sono simili (§ 302). Dell'istesso modo si dimostra essere il triangolo ADE simile ad LOP , ed EFA simile a PQL . Per la qual cosa se dai vertici, ec. . Ch' è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. XXV. TEOR. XVIII.

331. *I triangoli simili hanno tra essi una ragione, ch' è duplicata di quella de' lati omologhi.*

DIMOSTRAZIONE.

Fig. 92 Sieno i triangoli ABC , DEF simili, cioè abbiano l'angolo $BAC = EDF$, $ACB = DFE$, e $CBA = FED$. Sarà $BA : AC = ED : DF$ (§ 299), e, permutando, $AB : DE = AC : DF$ (§ 279). Ma la ragione de' triangoli ABC , DEF è composta dalle ragioni di $AB : DE$, e di $AC : DF$ (§ 325.). Sicchè, essendo sì fatte ragioni componenti uguali, la ragione de' triangoli ABC , DEF farà duplicata d'una di esse (§ 247), e perciò duplicata della ragione de' lati omologhi AB , DE .
Ch'

Ch' è ciò , che bisognava dimostrare.

PROP. XXVI. TEOR. XIX.

332. *I poligoni simili hanno tra essi una ragione , ch' è pure duplicata di quella de' lati omologhi.*

DIMOSTRAZIONE.

Sieno i poligoni ABCDEF , LMNOPQFi.106 simili ; e dai vertici degli angoli uguali in A , ed L si tirino ai vertici degli angoli opposti le rette AC , AD , AE , LN , LO , LP ; faranno i triangoli ABC , ACD , ADE , AEF rispettivamente simili ad LMN , LNO , LOP , LPQ (§ 330). Essendo le ragioni di BC : MN , di CD : NO , di DE : OP , di EF : PQ tutte uguali , uguali saranno ancora le duplicate di esse (§ 270), e conseguentemente uguali ancora le ragioni del triangolo ABC : LMN , di ACD : LNO , di ADE : LOP , di AEF : LPQ (§ prec.). Sicchè la somma di tutti gli antecedenti delle ultime ragioni farà alla somma di tutt' i conseguenti , come uno degli antecedenti al suo conseguente (§ 288), o sia il poligono ABCDEF al poligono LMNOPQ , come ABC : LMN , e perciò in duplicata ragione di AB : LM (§ prec.) Ch' è ciò , che bisognava dimostrare.

CO.

COROLLARIO I.

333. Si prolunghi LM in R, finchè sia LR terza proporzionale in ordine ad AB, LM. Sarà la ragione di AB : LR duplicata della ragione di AB : LM (§ 269), e conseguentemente uguale alla ragione del poligono ABCEDEF al poligono LMNOPQ.

COROLLARIO II.

334. Essendo in oltre i quadrati tutti simili tra essi, faranno pure i quadrati in ragione duplicata de' lati di essi. Onde la duplicata della ragione di due linee è l'istessa della ragione de' quadrati fatti sulle medesime linee. E perciò appresso si farà uso spesso volte della ragione de' quadrati di due linee in vece della duplicata delle medesime linee.

PROP. XXVII. TEOR. XX.

Fi. 105 335. *Se quattro rette A, B, C, D sono proporzionali, i rettilinei simili, che hanno per lati omologhi A, e B, sono proporzionali co' rettilinei simili, che hanno per lati omologhi C, e D; e se A, B, C, D sono tali, che i rettilinei simili, che hanno per lati omologhi A, e B, sono proporzionali co' rettilinei simili, che hanno per lati omologhi*

ghi C , e D , le rette A , B , C , D sono proporzionali .

DIMOSTRAZIONE.

I. Sieno le ragioni di $A : B$, e di $C : D$ uguali , uguali faranno pure le duplicate di esse (§ 270) . Dunque la ragione de' rettilinei simili , che hanno per lati omologhi A , e B , è uguale alla ragione de' rettilinei simili , che hanno per lati omologhi C , e D (§ 332) .

II. Sia la ragione de' rettilinei simili , che hanno per lati omologhi A , e B , uguale alla ragione de' rettilinei simili , che hanno per lati omologhi C , e D . Saranno le duplicate delle ragioni di $A : B$, e di $C : D$ uguali (§ 332) . Onde uguali faranno ancora le ragioni di $A : B$, e di $C : D$ (§ 271) . Ch'è quanto bisognava dimostrare.

PROP. XXVIII. PROBL. VIII.

336. Dato un rettilineo , e data una Fi. 106
retta , costruire su di essa un'altro rettilineo simile al dato .

SOLUZIONE.

Sieno $ABCDEF$ il rettilineo dato , ed LM la retta data .

1. Si divida il rettilineo dato in quanti
triang.

triangoli si può dividere colle rette AC , AD , AE .

2. Ne' punti L , ed M di LM si facciano gli angoli MLN , LMN rispettivamente uguali a BAC , ABC (§ 67); s'avrà l'angolo $LMN = ACB$ (§ 89).

3. Si facciano ne' punti L , ed N di LN gli angoli NLO , LNO rispettivamente uguali a CAD , ACD ; s'avrà l'angolo $LON = ADC$.

4. Ne' punti L , ed O di LO si facciano gli angoli OLP , LOP rispettivamente uguali a DAE , ADE ; s'avrà l'angolo $LPO = AED$.

5. Finalmente ne' punti L , e P di LP si facciano gli angoli PLQ , LPQ rispettivamente uguali ad EAF , AEF ; s'avrà l'angolo $LQP = AFE$.

Dico essere $LMNOPQ$ il rettilineo cercato.

DIMOSTRAZIONE.

Essendo la somma degli angoli fatti in L , N , O , P uguali rispettivamente alla somma degli angoli componenti quelli, che sono in A , C , D , E ; faranno i rettilinei $LMNOPQ$, $ABCDEF$ tra essi equiangoli. In oltre i triangoli LMN , LNO , LOP , LPQ sono rispettivamente equiangoli con ABC , ACD , ADE , AEF . Dunque $LM : MN = AB : BC$, $MN : NL = BC : CA$,
 $LN :$

$LN : NO = AC : CD$ (§ 299). Onde
 $MN : NO = BC : CD$ (§ 286). Simil-
 mente si dimostra essere $NO : OP = CD :$
 DE , $OP : PQ = DE : EF$, $PQ : QL =$
 $EF : FA$. Finalmente, avendo LM , MN ,
 NO , OP , PQ , QL ragioni ordinate ad AB ,
 BC , CD , DE , EF , FA , sarà $LM : LQ$
 $= AB : AF$ (§ 286), e, invertendo, $QL : LM$
 $= FA : AB$. Sicchè su LM s'è costruito il
 rettilineo $LMNOPQ$ simile al dato $ABC-$
 DEF . Ch'è ciò che bisognava fare, e di-
 mostrare.

PROP. XXIX. PROBL. IX.

337. Dato il rettilineo $ABCDEF$, e data
 la ragione di $AB : LR$, costruire un' altro
 rettilineo simile al dato, al quale l' istesso
 rettilineo dato abbia la ragione di $AB : LR$.

SOLUZIONE.

1. Si trovi tra AB , ed LR la mezza
 proporzionale LM (§ 318).

2. Su LM si costruisca il rettilineo $LM-$
 $NOPQ$ simile ad $ABCDEF$ (§ prec.).

Dico essere $LMNOPQ$ il rettilineo cer-
 cato.

DIMOSTRAZIONE.


Essendo i rettilinei $ABCDEF$, $LMNO-$
 PQ simili per la costruzione; ed essendo

Tom. II.

O

AB

AB, LM, LR continuamente proporzionali; faranno i rettilinei ABCDEF, LMNOPQ nella ragione di AB:LR (§ 333). Sicchè s'è costruito il rettilineo LMNOPQ simile al dato, al quale l'istesso rettilineo dato ha la ragione di AB:LR. Ch'è ciò, che bisognava fare, e dimostrare.



C A P. VII.

Delle ragioni degli angoli fatti e ai centri, e alle circonferenze de' cerchi, e di quelle de' settori circolari.

PROP. XXX. TEOR. XXI.

338. Ne' cerchi uguali AEB, CFD gli
 Fi. 107 angoli AOB, CPD fatti ne' centri, e gli
 angoli AEB, CFD fatti nelle periferie sono nella ragione degli archi AB, CD su quali appoggiano; ed i settori AOB, CPD sono pure nella ragione degli archi, da quali sono terminati.

DIMOSTRAZIONE.

I. S' intendano gli archi AB, CD divisi nelle parti AG, GH, HI, IB, CK, KL, LD, delle quali ognuna sia uguale all' aliquo-

quota comune di essi ; e s' intendano dai centri O , e P tirate le rette OG , OH , OI , PK , PL . Saranno tutti gli angoli AOG , GOH , HOI , IOB , CPK , KPL , LPD uguali (§ 158, e 159). Perciò l'angolo AOG , e l'arco AG sono aliquote simili sì dell'angolo CPD , e dell'arco CD , che dell'angolo AOB , e dell'arco AB . Per la qual cosa l'angolo AOB sta all'angolo CPD , come l'arco AB all'arco CD (§ 257).

II. Gli angoli AEB , CFD , come metà di AOB , CPD (§ 165), sono nella ragione di AOB , CPD (§ 280), e perciò nella ragione di $AB:CD$ (§ 245).

III. S' intenda rivoltato il settore AOG sul settore GOH . Combaciando l'angolo AOG con GOH , combacerà anche il settore AOG col settore GOH . Sicchè i settori AOG , GOH sono uguali (§ 57). Similmente si dimostra che ognuno de' settori HOI , IOB , CPK , KPL , LPD uguaglia il settore AOG . Perciò il settore AOG , e l'arco AG sono aliquote simili sì del settore CPD , e dell'arco CD , che del settore AOB , e dell'arco AB . Per la qual cosa i settori AOB , CPD sono nella ragione degli archi AB , CD (§ 257). Ch'è quanto bisognava dimostrare.

COROLLARIO.

339. Quindi si ricavano le seguenti conseguenze. I. Che gli angoli fatti o al centro d' un' istesso cerchio , o alla periferia sono nella ragione degli archi , a' quali appoggiano; e che i settori d' un istesso cerchio sono pure nella ragione degli archi , da' quali sono terminati. II. Che ogni angolo fatto al centro d' un cerchio sta a quattro retti , come l' arco , al quale quello appoggia , all' intera periferia , o come il numero de' gradi dell' arco a 360° . III. Che ogni settore d' un cerchio sta all' intero cerchio , come l' arco , dal quale viene terminato il settore , all' intera periferia , o come il numero de' gradi del detto arco a 360° .

PROP. XXXI. TEOR. XXII.

Fi. 108 340. Sieno AEB , CFD due cerchi qualunque , e sieno formati angoli uguali AOB , CPD ne' centri , e per conseguenza angoli uguali AEB , CFD nelle periferie . Dico che gli archi AB , CD sono proporzionali alle intere periferie , e che i settori AOB , CPD sono proporzionali agl' interi cerchi .

DIMOSTRAZIONE.

I. Essendo l'angolo $AOB = CPD$; sarà l'angolo AOB a quattro retti come CPD a quattro retti (§ 262). E perciò l'arco AB sta alla periferia AEB , come CD alla periferia CFD (§ *prec.*); e, permutando, l'arco $AB : CD$, come la periferia $AEB : CFD$ (§ 279).

II. Essendosi dimostrato essere l'arco AB alla periferia AEB , come CD alla periferia CFD ; sarà il settore AOB al cerchio AEB , come il settore CPD al cerchio CFD (§. *prec.*). Onde , permutando sarà il settore AOB al settore CPD , come il cerchio AEB al cerchio CFD . Ch' è quanto bisognava dimostrare .


PROP. XXXII. TEOR. XXIII.

341. Sieno AEB, CFD due cerchi qualunque , e sieno gli archi AB, CD proporzionali alle intere periferie , o i settori AOB, CPD proporzionali agl' interi cerchi . Dico essere uguali gli angoli AOB, CPD fatti ne' centri , e conseguentemente uguali gli angoli AEB, CFD fatti nelle periferie.

DIMOSTRAZIONE.

I. Essendo per l'ipotesi l'arco $AB:CD$, come la periferia AEB alla periferia CFD ; farà, permutando, l'arco AB alla periferia AEB , come l'arco CD alla periferia CFD (§ 279). E perciò farà l'angolo AOB a quattro retti, come CPD a quattro retti (§ 339). Per la qual cosa l'angolo $AOB = CPD$ (§ 264), e conseguentemente $AEB = CFD$.

II. Essendo pure per l'ipotesi il settore $AOB:CPD$, come il cerchio $AEB:CFD$; farà, permutando, il settore AOB al cerchio AEB , come il settore CPD al cerchio CFD (§ 279). E perciò l'arco AB alla periferia AEB , come l'arco CD alla periferia CFD (§ 339). Onde l'angolo $AOB = CPD$, e conseguentemente l'angolo $AEB = CFD$. Ch'è quanto bisognava dimostrare.



C A P. VHL.

*Delle regioni , che hanno le periferie
circolari , i cerchi , ed i settori ,
e le porzioni di essi , e della
quadratura di tali spazj .*

DEFINIZIONE.

342. Simili si dicono due archi circolari *Fi. 108*
 AB, CD , se sono proporzionali alle intere
periferie AEB, CFD : Parimente simili si
dicono due settori AOB, CPD , e simili
due porzioni circolari AB, CD , se vengono
terminati da archi simili AB, CD .

COROLLARIO I.

343. Quindi , se gli archi AB, CD sono
simili , e conseguentemente simili i settori
 AOB, CPD , e simili le porzioni AB, CD
circolari , sono uguali sì gli angoli $AOB,$
 CPD fatti ne' centri , che gli angoli $AEB,$
 CFD fatti nelle periferie (§ 341.), e con-
seguentemente uguali gli angoli fatti nelle
porzioni AB, CD ; e , se sono uguali gli
angoli AOB, CPD , e conseguentemente sì
gli angoli AEB, CFD , che gli angoli fatti
O 4 nelle

nelle porzioni AB, CD , gli archi AB, CD sono simili; e conseguentemente simili si i settori AOB, CPD , che le porzioni circolari AB, CD . E perciò le porzioni, che comprendono angoli uguali, sono simili tra esse.

COROLLARIO II.

344. In oltre essendo i settori AOB, CPD proporzionali all' interi cerchi, se gli archi AB, CD sono proporzionali alle intere periferie, ed al contrario: è manifesto i settori simili essere proporzionali agl' interi cerchi, ed i settori proporzionali agl' interi cerchi essere simili tra essi.

LEMMA.

345. *Ogni archetto circolare infinitamente piccolo per rispetto dell' intera periferia si può senza errore sensibile prendere come congruente colla sua tangente.*

DIMOSTRAZIONE.

Fi. 109. S' intenda nel centro O del cerchio AHL fatto l' angolo AOB infinitamente picciolo per rispetto d' un retto, e molto più per rispetto di quattro retti; e s'intendano tirate la corda AB , e la tangente AC , che s'unisca col raggio OB prolungato in C . Es.

Essendo l'arco AB all'intera periferia, come l'angolo AOB a quattro retti (§ 339); ed essendo l'angolo AOB infinitamente picciolo per rispetto di quattro retti, farà l'archetto AB per rispetto dell'intera periferia anche infinitamente picciolo. In oltre l'angolo BAC, come metà dell'angolo AOB (§ 174), si può avere in conto d'un nulla per rispetto d'un retto. Dunque l'angolo OAB si può senza errore sensibile prendere per un retto, e conseguentemente come uguale ad OAC. Onde senza errore sensibile si può prendere la corda AB, come congruente colla tangente AC; e molto più l'archetto AB, che tramezza tra la corda AB, e la tangente AC, si può prendere come congruente colla tangente AC. Sicchè ogni archetto circolare, &c.. Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

PROP. XXXIII. TEOR. XXIV.

346. *Le periferie de' cerchi sono tra esse nella ragione de' raggi; ed i cerchi sono tra essi nella ragione de' quadrati de' medesimi raggi.*

DIMOSTRAZIONE.

Sieno posti i due cerchi AHL, DKM uno sull'altro in modo, che O sia il centro comune di essi, e nel centro O s'intenda fat-

fatto l'angolo AOB , che sia infinitamente picciolo per rispetto d'un retto, e sieno di più per A , e D tirate le tangenti AC , DF . Si potranno senza errore sensibile prendere gli archetti AB , DE come congruenti colle tangenti AC , DF .

I. Essendo gli archetti AB , DE simili (§ 343); sarà la ragione delle periferie AHL , DKM uguale a quella degli archetti AB , DE (§ 342), e perciò uguale a quella delle rette AC , DF . Ma, per la simiglianza de' triangoli AOC , DOF , sta $CA : DF = AO : DO$ (§ 299). Dunque la ragione delle periferie AHL , DKM è uguale a quella de' raggi AO , DO (§ 245).

II. Essendo gli archetti AB , DE simili, e conseguentemente simili i settori AOB , DOE ; sarà la ragione de' cerchi AHL , DKM uguale a quella de' settori AOB , DOE (§ 344), e conseguentemente uguale a quella de' triangoli OAC , ODF . Ma la ragione de' triangoli OAC , ODF è uguale a quella de' quadrati di AO , DO (§ 331). Dunque i cerchi AHL , DKM sono tra essi nella ragione de' quadrati de' raggi AO , DO (§ 245). Ch'è quanto bisognava dimostrare.

COROLLARIO.

347. Sieno i settori GOH , IOK simili; e conseguentemente simili le porzioni circolari

lari GH, IK. Saranno sì fatti settori nella ragione de' cerchi interi (§ 344), e conseguentemente nella ragione de' quadrati de' raggi GO, IO (§ prec.). Ed essendo i triangoli GOH, IOK pure nella ragione de' quadrati di GO, IO (§ 331); faranno anche le porzioni circolari GH, IK nella ragione de' quadrati de' raggi GO, IO (§ 290). Dunque nella ragione de' quadrati de' raggi sono e i settori simili, e le porzioni circolari simili.

PROP. XXXIV. TEOR. XXV.

348. *Ogni cerchio è uguale ad un triangolo, che ha per base una retta uguale alla periferia, e per altezza il raggio.*

DIMOSTRAZIONE.

Rappresentino AHL qualunque cerchio; ed AB la parte infinitamente piccola della sua periferia. S'intendano tirati i raggi OA, OB, e per A tirata la tangente AC, che s'unisca col raggio OB prolungato in C. Sarà il cerchio AHL al settore AOB, come la periferia AHL all'arco AB (§ 339), o come la periferia AHL alla tangente AC; e perciò come il triangolo, che ha per base una retta uguale alla periferia AHL, e per altezza il raggio AO, al triangolo AOC (§ 322), o sia al settore AOB. Sicchè
il

il cerchio AHL è uguale ad un triangolo , che ha per base una retta uguale alla sua periferia , e per altezza il raggio (§ 254). Ch'è ciò , che bisognava dimostrare.

PROP. XXXV. TEOR. XXVI.

349. *Ogni settore circolare GOH è uguale ad un triangolo , che ha per base una retta uguale all' arco GH , e per altezza il raggio del cerchio.*

DIMOSTRAZIONE.

Imperciocchè il settore GOH sta al cerchio AHL , come l' arco GH alla periferia GHL (339) ; e perciò come il triangolo , che ha per base l' arco GH , e per altezza il raggio GO , al triangolo , che ha per base la periferia GHL , e per altezza l' istesso raggio GO (§ 322). Ma il cerchio AHL è uguale al triangolo , che ha per base la periferia AHL , e per altezza il raggio GO (§ prec.). Dunque anche il settore GOH è uguale ad un triangolo , che ha per base una retta uguale all' arco GH , e per altezza il raggio GO del cerchio (§ 264). Ch'è ciò , che bisognava dimostrare.

A V V E R T I M E N T O.

350. Si noti che per poter determinare una retta uguale alla periferia di qualunque cerchio, o a qualsivis arco circolare, non s'è trovata strada alcuna nè nella Geom. elementare, nè nella Geom. sublime. Si sono perciò i Geometri ingegnati di poterla determinare a un di presso con ricercare la ragione, che passa tra la periferia di qualunque cerchio, e 'l suo diametro, non vera, ma assai prossima alla vera; e in sì fatta ricerca sono proceduti sì innanzi, che l'errore nella detta determinazione puole rendersi insensibile a segno da non offendere punto l'esattezza geometrica. Come intanto si può determinare sì fatta ragione, e quale essa sia, si dirà nel capo seguente. Perciò sia il



C A P. IX.

Della ragione , che senza sensibile errore si può prendere per quella del diametro di qualunque cerchio alla sua periferia .

L E M M A .

FIG. 351. *I lati di due poligoni regolari simili, uno iscritto in un cerchio, e l'altro circoscritto intorno al medesimo cerchio, sono tra essi nella ragione della distanza dal centro del lato dell' iscritto al raggio del cerchio.*

D I M O S T R A Z I O N E .

Contrassegni AB il lato di qualunque poligono regolare iscrivibile nel cerchio ABG . Si congiungano i raggi OA OB ; e, diviso l'arco AB in due parti uguali in E , si tiri per E la tangente CD , che s' unisca co' raggi OA , OB prolungati in C , e D . Sarà CD un lato del poligono regolare circoscrittibile intorno al cerchio ABG , e dell' istesso numero di lati dell' iscrivibile, a cui AB appartiene. Si congiunga di più OE . Dividendo OE l'arco AB in due parti uguali
in

in E, dividerà anche la retta AB in due parti uguali, e conseguentemente ad angoli retti in F (§ 140). Sicchè l'angolo OFA è retto. E' altresì retto l'angolo OEC (§ 150). Dunque AB, CD sono parallele (§ 82); e perciò i triangoli AOB, COD sono simili (§ 298). Per la qual cosa $AB : CD = OA : OC$ (§ 299). Ma $OA : OC = OF : OE$ (§ 292). Sicchè $AB : CD = OF : OE$ (§ 245). Ch'è ciò, che bisognava dimostrare.

COROLLARIO.

352. Essendo $OF : OE = AB : CD$. Se la ragione di $OF : OE$ è quasi d'uguaglianza, la ragione di $AB : CD$ è anche quasi d'uguaglianza. Dunque qualora la differenza di OF dal raggio OE è poco sensibile, poco sensibile è anche la differenza de' lati AB, CD; e molto meno sensibile è la differenza dell'arco AEB da' medesimi lati AB, CD. Per la qual cosa se due poligoni regolari simili sono uno iscritto in un cerchio, e l'altro circoscritto intorno dell'istesso cerchio, e la differenza, che passa tra la distanza del lato dell'iscritto dal centro, e'l raggio è poco sensibile, si può allora senza errore sensibile prendere pel cerchio ciascuno di sì fatti poligoni, e per la sua periferia il perimetro de' medesimi poligoni.

AV.

AVVERTIMENTO I.

353. Si noti che , congiunta AE , lato del poligono regolare iscrivibile pure nel cerchio ABG , e d'un numero di lati doppio del numero de' lati del poligono , a cui appartiene AB , ed espressi co' numeri della medesima unità il raggio AO , e 'l lato AB , si possono successivamente trovare tre altri numeri della medesima unità de' detti , esprimenti uno la retta OF , con estrarre la radice quadrata dalla differenza de' quadrati fatti co' numeri esprimenti le rette OA , AF , l'altro la retta EF , con togliere dal numero esponente il raggio quello , ch' esprime OF , e 'l terzo la retta AE , con estrarre la radice quadrata dalla somma de' quadrati de' numeri esprimenti AF , FE . E si può altresì avere relativamente alla medesima unità il numero esponente CD , con trovare il quarto proporzionale in ordine ai tre numeri esprimenti OF , OE , AB , e conseguentemente con dividere , se sarà $OE = 1$, il numero esponente il lato AB pel numero esponente la distanza OF dal centro .

AVVERTIMENTO II.

354. Si noti di vantaggio che , per esprimere con brevità nel probl. seguente , contraf-

traffegneremo con AB^2 il quadrato della retta AB , e con $\frac{1}{4} AB^2$ la quarta parte del medesimo quadrato. Di più contraffegneremo con $AB^2 + CD^2$ la somma de' quadrati delle rette AB , CD , e con $AB^2 - CD^2$ la differenza de' medesimi quadrati, intramettendo tra AB^2 , e CD^2 nel primo caso il segno $+$, che s' esprime col vocabolo *più*, e nel secondo caso il segno $-$, che s' esprime col vocabolo *meno*. Ciò posto, venghiamo alla

PROP. XXXVI. PROBL. X.

355. *Trovare una ragione, che senza errore sensibile si possa prendere per quella del diametro di qualsivoglia cerchio alla periferia.*

S O L U Z I O N E.

1. Si metta di qualunque cerchio ACB Fig. III il raggio $OA = 1$; e nel medesimo cerchio sia adattata AB , lato dell' esagono regolare iscrivibile in esso. Sarà $AB = OA = 1$ (§ 198).

2. S' intendano divisi in due parti uguali successivamente gli archi AB in C , AC in D , AD in E , AE in F , AF in G , ec.; e s' intendano tirate le rette AC , AD , AE , AF , AG , ec. Saranno AC , AD , AE , AF , AG , ec. lati delle figure regolari di 12, 24, 48, 96, 192, ec. lati, iscrivibili

Tom. II.

P

pu.

pure nel cerchio ACB .

3. Relativamente al raggio, posto $= 1$, si vadano successivamente trovando e i numeri esprimanti i quadrati di AC , AD , AE , AF , AG , ec., ed i numeri esprimanti le distanze di sì fatti lati dal centro O (§ 353); e ciò si faccia, finchè si pervenga a un lato, la cui distanza dal centro sia quasi $= 1$.

4. Si determini il numero esprime il lato, la cui distanza dal centro è quasi $= 1$; e s' avrà il numero esprime un lato del poligono regolare iscrivibile nel cerchio, il cui perimetro di poco mancherà dalla periferia del medesimo cerchio (§ 352).

5. Si divida il numero esprime il lato del detto poligono pel numero esprime la sua distanza dal centro; e s' avrà il numero esprime un lato del poligono regolare circoscrivibile intorno all'istesso cerchio, e dell' istesso numero di lati dell' iscrivibile anzidetto (§ 353); il perimetro del quale poligono circoscrivibile di poco eccederà la periferia del cerchio (§ 352).

6. Si moltiplichino i numeri esprimanti i lati determinati de' due detti poligoni pel numero de' lati di essi; e così s' avranno i numeri esprimanti i perimetri de' medesimi poligoni.

Le ragioni de' numeri esprimanti i detti perimetri al numero 2, esprime il diametro del cerchio, faranno i limiti, tra' qua-

quali farà racchiusa la ragione della periferia del cerchio al diametro; e tali limiti faranno più, o meno prossimi tra essi, secondo che la distanza dal centro de' lati del poligono iscrivibile nel cerchio, che si prenderà, come poco diverso dal cerchio, avrà una differenza dal raggio meno, o più sensibile. La ragione poi della metà della somma de' numeri esprimanti i medesimi perimetri al 2. farà la ragione, che senza errore sensibile si potrà prendere per quella della periferia del cerchio al diametro. Ecco-
ne il

...C A L C O L O

Si congiungano le rette OC, OD, OE, OF, OG, ec.. Essendo $AO = AB = 1$, farà $AH = \frac{1}{2} = 0.500000$. Onde farà.

I.

$$OH^2 = OA^2 - AH^2 = 0,75 \text{ м}^2$$

E perciò

$$\frac{OH}{Na} = 0.866025$$

$$\text{HC} = \text{OC} - \text{OH} = 0.133975$$

$$AC^2 = AH^2 + CH^2 = 0.267949300625.$$

II.

$$OI^2 = OA^2 - \frac{1}{4} AG^2 = 0.933912674844$$

E perciò

$$OI = 0.965925$$

$$ID = OD - OI = 0.034075$$

$$AD^2 = AI^2 + ID^2 = 0.068148430781.$$

III.

$$OK^2 = OA^2 - \frac{1}{4} AD^2 = 0.982962892305.$$

E perciò

$$OK = 0.991444$$

$$KE = OE - OK = 0.008556$$

$$AE^2 = AK^2 + KE^2 = 0.017110312831.$$

IV.

$$OL^2 = OA^2 - \frac{1}{4} AE^2 = 0.995722421793.$$

E perciò

$$OL = 0.997858$$

$$LF = OF - OL = 0.002142$$

$$AF^2 = AL^2 + LF^2 = 0.004282166371.$$

V.

V.

$$OM^2 = OA^2 - \frac{1}{4} AF^2 = 0.998929458408.$$

E perciò

$$OM = 0.999464$$

$$MG = OG - OM = 0.000536$$

$$AG^2 = GM^2 + AM^2 = 0.001070828888.$$

VI.

$$OP^2 = AO^2 - \frac{1}{4} AG^2 = 0.999732292778.$$

E perciò

$$OP = 0.999866.$$

Venendo dunque la distanza OP del lato AG del poligono regolare di 192 lati quasi = 1, il perimetro di sì fatto poligono mancherà di poco dalla periferia del cerchio. Or essendosi trovato $AG^2 = 0.001070828888$, farà $AG = 0.032723$; e perciò l'intero perimetro di sì fatto poligono = 62.282816. Di più il lato del poligono regolare di 192 lati circoscrittibile intorno al medesimo cerchio farà = 0.032723
 $\frac{0.032723}{0.999866} = 0.0327227$ (§ 353). Sic-

chè

chè il perimetro di quest' altro poligono sarà $= 6 \cdot 283584$. Per la qual cosa le ragioni di $6 \cdot 283584 : 2$, e di $6 \cdot 282816 : 2$ sono i limiti bastantemente prossimi, tra' quali è racchiusa la ragione della periferia del cerchio al diametro. Onde la ragione, che senza sensibile errore si potrà prendere per quella della periferia al diametro, sarà la ragione di $6 \cdot 283200 : 1$; o di $3 \cdot 1416 : 1$, o di $3 \cdot 141 : 1$. Ch' è ciò, che bisognava trovare.

A V V E R T I M E N T O.


356. Si noti che l'insigne Archimede prima di tutti trovò essere della ragione della periferia al diametro quella di $22 : 7$ alquanto maggiore della vera, e quella di $223 : 71$ alquanto minore. Mezzo trovò la ragione della periferia al diametro essere a un di presso uguale alla ragione di $355 : 113$; e questa ragione è più prossima alla vera di quella di $22 : 7$. Ludolfo a Ceulene ha data una ragione assai prossima alla vera, ma composta da moltissimi caratteri; e noi nel 2° tomo degli elementi di Algebra ne abbiamo data un' altra più prossima di quella di Ceulene, però con maggior numero di caratteri. Del resto noi faremo sempre uso, quando il bisogno l'esigerà, della ragione qui determinata, cioè di quella di $3 \cdot 141 : 1$, per essere essa bastante-
men-

mente prossima alla ragione vera della periferia al diametro, e affai comoda nella pratica, come si vedrà a suo luogo.

Fine del Libro quarto.

606447















Fig. 7

Fig. 8



Fig. 9



Tav. II.

Fig. 11




Fig. 12




Fig. 14




Fig. 15




Fig. 17











Fig. 18







1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

2. The second part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

3. The third part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

4. The fourth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

5. The fifth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

6. The sixth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

7. The seventh part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

8. The eighth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

9. The ninth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

10. The tenth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

11. The eleventh part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

12. The twelfth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

Fig. 32



Fig. 33





Fig. 34




Fig. 36




Fig. 37




Fig. 39








Fig 42




Fig 44




Fig 45



Fig 47



Fig 48




Fig 50






Figure 6



51





Fig 52



A

Fig 54

F
C
D
F




Fig 55




Fig 57

D




Fig 58





Fig 60






Fig 63




Fig 64




Fig 66




Fig 67




Fig 70




Fig 71





Fig. 74




Fig. 73




Fig. 75




Fig. 78




Fig. 80




Fig. 81




Fig. 82






Fig. 84





Fig. 85



83



Fig. 87 +




Fig. 89




Fig. 90




Fig. 91






Fig. 92




Fig. 93




Fig. 94 *



Fig. 95





Fig. 97




Fig. 99




Fig. 98





Fig. 101







Fig. 102



Fig. 105







Fig. 109



30





Fig. 110*Fig. 111*